



Obsatz 7. 1b. 3. fol. 167.



K. J. Markon.

photo: Birds p. 163.





ICONES AVIVM OM-  
NIVM, QVAE IN HISTORIA AVIVM CON-  
RADI GESNERI DESCRIBVNTVR, CVM NOMENCLA-  
TVRIS SINGVLORVM LATINIS, ITALICIS, GAL-  
LICIS ET GERMANICIS PLERVNQVE, PER  
CERTOS ORDINES DIGESTAE.

EDITIO *secunda, novis aliquot Eiconibus aucta.*

I Ritratti e le figure de gli ucelli.

LES Figures & pourtraictz des oiseaux.

Die Figuren vnd contrafacturen der vögel.



CVM Privilegijs S. Cefareæ Maieftatis ad annos octo,  
& Christianiffimi Regis Galliarum ad decennium.

TIGVRI EXCVDEBAT C. FROSHOVERVS,  
ANNO M. D. LX.





# GENEROSO ET MAGNIFICO VIRO VLRI

CHO FVGGERO, KIRCHBERGAE ET VVEISSENHORNI

Comiti, &c. domino & Mœcenati suo bene merito Conradus

Gefnerus Tigurinus S. D. P.



VOThomines tot sententiæ, & suū cuiq; pulchrum. Et ut circa cibū ac potum Tres mihi conuiuæ prope dissentire uidentur Poscentes uario multum diuersa palato: sic ingeniorum quoq; (uir nobilissime) mira uarietas est, non modo alijs alia studiū genera probantibus, sed in eodem etiam genere alium atq; alium modū. Plerunq; tamen ita cōtingit, ut illi qui certatione & aliquo fine sibi proposito in literis uersantur, quod ex professio studiū delegerint, in eo prolixè ac diligentissime sese exerceāt: in proximis mediocriter, remotiora uel degustasse contenti. Quod cum animaduertem in illustranda Animalium historia triplicem modum mihi proposui. Primum enim omnia huius argumenti scriptorum (nisi prorsus falsa aut barbara essent) omnium collegi, & de proprijs obseruationibus nō pauca adieci, in libris duobus de Quadrupedibus uiuis parīs ac ouiparīs, & nunc tertio de Auiibus à me æditis, Quod si uisero, eorundem Cōpendia breui publicanda curabo. Deinde icones cū splis nomenclaturis (in quibus præcipua difficultas est) separatim exhibui, Quadrupedum antea hæc, nunc etiam Auium, in illorū gratiam qui hæc tantum degustare, & picturis spectandis se oblectare potius, ac sola tenēre nomina, quā prolixiori lectione animalium naturas cognoscere uoluerint. Est autem honesta hæc oblectatio ingenuis animis, ab altioribus studijs & cōtemplationibus aliquādo se demittentibus: quemadmodum oculis cœlos eorumq; splendorem contemplatis, deorsum ad terram & stirpium uirorem sese reuocare & ita recreare iucundū est, sic enim nimium lucis obtutu dispersa ac hebetata oculorū acies colligitur. Et sanè animus quoq; res maximas & diuinas contemplantis, in earū amplitudine & excellētia ueluti dispergitur, & immēsa luce percellitur: inde ad res inferiores demissus ad sese redit, seq; iterum colligit, quandiu enim in hoc corporis tanquam carcere animus noster coerceatur, nihil sine phantasia agere & concipere potest, atq; ea ex parte passibilis est, & re creatione per interualla indiget. Cum igitur te quoq; uiderem VLRI CHE FVGGERE Mecœnas optime, in magnarum & sacrarum rerum lectionumq; studijs subinde exerceri, atq; adeo tempus omne quod huc non collocaueris, tibi perire arbitrari: has Auium icones supra ducentas, suis depictas coloribus, quibus spectandis & oculos & animum aliquando recreares, grauioribus studijs & curis intermissis, Excellentiæ tuæ offerre ac dedicare uolui. Nam & tua & gentiliū tuorū (patraui imprimis ANTONII, & fratris IOAN. IACOBI clarissimorum heroum) liberalis in me beneuolentia, aliquid à me gratitudinis officiū postulat. Et insuper mereatur illustri nobilitas & excellēs doctrina tua, claris publicisq; testimonijs celebrari. Tu enim inter nobiles nostri seculi doctissimus, inter doctos nobilissimus es. Tu utriusq; linguæ & optimarum scientiarū cognitione tantum profecisti, ut eruditissimus quisq; ad hoc sapientiæ simul & eloquentiæ fastigium in hac ætate & hoc splendore fortunæ te peruenisse miretur. Non uerò eruditas tantum illas, sed etiam uulgares linguas, in quibus ego animalium nomenclaturas propono, Germanicam, Italicam & Gallicam, egregiè diserteq; calles, adeo ut uel Italus uel Gallus Germanū te esse ex sermone non facile deprehendat. Suscipe igitur hunc librum serena fronte, ut partim in Auiibus spectandis delectēre, partim Platonis illud ex Phædro tibi in mentē ueniat, uiri etiam boni & sapientis animā, quæ relictis humanis curis sursum ad cœlos subinde euolet, uolucrem & alatam esse. Sic enim ait

Plato: *ἡ ψυχὴ δὲ διώκει τὰ ὑπερβαίνει ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ πάλιν ἀναστρέφεται πρὸς τὰ ἀθάνατα. καὶ οὕτως ἀεὶ ἀναστρέφεται πρὸς τὰ ἀθάνατα, καὶ οὕτως ἀεὶ ἀναστρέφεται πρὸς τὰ ἀθάνατα.*  
*πυ μάλιστα τῷ πνεύματι τοῦ σώματος τοῦ σώματος. τὸ δὲ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα, ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ τὸ πνεῦμα, καὶ πάλιν ἀναστρέφεται πρὸς τὰ ἀθάνατα.*  
*τὸ πνεῦμα δὲ πρὸς τὰ ἀθάνατα, καὶ οὕτως ἀεὶ ἀναστρέφεται πρὸς τὰ ἀθάνατα.*

Vale Tiguri, tertio idus Martij

anno Salutis M. D. L V.

ORDINVM singularum argumenta in fine libri posuimus.



3  
AVIVM ORDO PRIMVS QVI

CONTINET AVES RAPACES. QVAE OM-  
nes rostris ac unguibus aduncis, & carniuorae sunt, & interdum uolant.

*F. litera prefixa nomen à nobis fictum significat, quoties uetus nullum inueniebamus.*

LATINE Aquila.

ITALICE Aquila.

GALLICE Aigle.

GERMAN. Adler.

Figura hæc aquilæ est, quæ in montibus Rhætiæ & Heluetiæ capitur.





Aquilæ genus, cuius picturam ab Argentinensi quodā pictore sum nactus, qui se eandem ab alijs ceu uerā accepisse aiebat. Nos hoc in ea præcipue miramur, quod crura coloribus diuersis insigniantur, sinistrum cæruleo, utrostrū quoq; dextrum fusco albicante, &c. Ergo si quæ huiusmodi aquila est, heteropus cognominari poterit.

GER. Ein adler geschlecht/an ein süß oder schenckel blau/aim anderē lichtgraw.



Aristoteli auis Scythica magnitudine Otidis. Circa Scythiam regionem Septentrionalem remotissimam aquila grandis detracta leporis pelle oua sua inuoluit, cuius foetifico calore pulli educuntur, ut scribit Olaus Magnus, ex cuius Regionū Septentrionalium tabula hanc figurā mutuati sumus. Omne genus aquilarum (inquit Albertus) partes uulpinæ pellis colligere solet, ut oua in eis reponat, uel in alijs mollibus & calidis pilis. Quod autem Plinius prodit aquilam aquilonarem oua in pelle uulpis inuoluta à ramis arborum suspendere, donec Solis calore perficiantur, expertus sum esse falsissimum, &c. Vide in Historia Aquilæ C.



GER M. Ein ander groß adler geschlecht in Nittnachtischen landē hinter Gotts land/ welcher einem hasen sin balg abzücht vnd wicklet sine eyer dzy n/ das sy von der wärme des balgs vrschließen/ als etlich schryben.



# Ordo primus.

5

Figura hæc siue aquilæ, siue maioris cuiusdam auis, quæ propter magnitudinem non in unius sed duarum aut plurium arborum uicinarum ramis nidificat, ex Tabula Regionum Septentrionalium Olai Magni desumpta est. Sed ipse in Tabulæ & picturarû explicatione, nullam huius auis mentionem facit. Nos in Capite de Aquilis diuersis apud recentiores, talem auem ex Ge. Fabricij ad nos epistola descripsimus.



Aristotelis Hypæetus, id est Subaquila, ut Gaza uertit: uel potius Gypæetus, id est Aquila uulturina. uidetur enim & corporis specie, & animo seu moribus, ex uulture & aquila mixtum hoc genus. Vocatur & Oripelargus, id est Ciconia montana, quod albicante & nigro coloribus ferè ut Ciconia distinguatur. & percnopterus, à nigro pennarum (in alis) colore. Hæc cuius iconem exhibemus auis, (quæ si Gypæetus non est, planè ei cognata & fortè magnitudine tantum diuersa fuerit,) semel tantum nostra memoria Basileæ capta est, omnibus ignota, Hebræis & Arabibus Racham & Alrachme dicitur.

GALLICE percnopterus Bellonius interpretatur Boudrée.

GERMAN. Ein stömbo Adler geschlecht/mag genennet werden Ein Geyradler.





**LATINE** Aquila anataria, Clanga, Planga, Percnus, Morphinus. Omnia enim (inquit Turnerus) quæ Aristoteles & Plinius percno tribuerunt Anglorum balbushardo (is autem est cuius picturam damus, ut facile ex Turneri descriptione coniectio) conueniunt, si solam magnitudinem exceperis, &c. Ego an Harpe Aristotelis sit hæc avis dubito, cognatam saltem ei esse putauerim.

**ITALICE** Aquilastro.

**GALLICE** Huart, ni fallor.

**GERMANICE** Moswy / Fischer / Entenstößel, hoc est, Miluus palustris, Piscator, Anataria uel Anaticida.





# Ordoprimus.

7

**LATINE** Accipiter absolutè, uel Accipiter maior, Firmico & recentioribus Astur. Pinximus autem sceminam, quòd in rapacium genere sceminæ maribus præsent. Tertiolum (aliqui tercellinum, uel tricellum, uel trizolum scribunt) uocatur mas in accipitrum & falconum genere, quia simul tres in nido nascuntur, duæ sceminæ, & tertius mas: qui scemina minor est, minusq; audax & fortis. Sceminæ quidem simpliciter accipitres aut falcones dicuntur, Crescentiensis.

**ITALICE** Astur, mas, Terzolo.

**GALLICE** Austour, mas, Tierzelet.

**GERMAN.** Habich/Hapch. Das männle/Ein Hapchle.



**LAT.** Accipiter minor, Nisus recentiorū. (nam Nisus Ouidij Hæætus est, id est Aquila marina,) Accipiter fringillarius Aristotelis, ut Alberto & nobis uidetur: etsi Turnerus accipitrem palumbariū hunc esse coniiciat, Mas recentioribus appellatur Muscetus.

**ITAL.** Sparuiero, Sparauier, Sparauiero, Loyetta.

**GALL.** Esperuier, Esparuier, mas, Muschet.

**GERM.** Sperber/Sperwer. Frills Wickel/ni fallor. Das männle/Ein Spring/Springel.





**LATINE** Tinnunculus Columellæ & Plinio, (quidā apud Plinium nō rectē tristunculū legunt,) Cenchris.

**ITALICE** Canibello, Tristinculo, Tristarello, Gauinello.

**GALLICE** Cercerelle, Quercerelle. In Narbonensi Gallia Siricach.

**GERMAN.** Wannenväher/  
Wandwäher/Wanntrwehen/  
Wiegwehē. Saxonib. Steinsgall/  
Steinschmarg.



**LAT.** Miluus, Miluius.

**ITALICE** Nichio, Miluio, Nibbio, Niggo.

**GALL.** Milan, Escorffle.

**GERMAN.** Weye / Wy/  
Weiher / Hünerey / Hünerey /  
nerdieb, Flädris Wüwe.





## Ordo primus.

9

**LATINE** Buteo, Triorches. Lanarius apud recentiores, & Villanus, Alberto etiam Buteus & Butherius.

**ITALICE** Aieta, circa lacū Verbanū. alibi, nisi fallor, Poyana, Bucciaro, Laincro.

**GALLICE** Buyfard, Buzart, Boufant, Lanier. Subaudis Boufat, Bosc, Lanooy. Faciunt autem Sabaudi genera busati quatuor. primum cognominant nobilē, alterum cōmunem, tertium albū aut caligatum, (blanc ou chaulsē,) quartū marinum.

**GERMANICE** Bushart/Busant/Busathn/Buse. Saxones Rüttelwy. Germani inferiores Brobuxen. Sunt qui genus quoddam buteonis improprie nominant Moswy/Moshuw. Albertus & Murmellius Lanarium Germanicē interpretantur, Lanete/Sweimer/Sweimer.





**LATINE** Falco, apud Firmicū, Suidam & recentiores, Aquila, Theodotion & Symmachus omnia accipitrū genera, uel omnes aues rapaces, quarū usus est in aucupio, falcones uocant. Accipitrem palumbarium Michaël Ephesius falconem gentilem (id est generosum) interpretatur, Niphus Italus. Accipiter palumbarius est falco tertiolus dictus, Idem,

**ITALICE** Falcon.

**GALLICE** Faulcon.

**GERM.** Falck. Belgis Valke. Est autē figura falconis, quam exhibemus, nigri: quem Germani priuatim **Kolfalck**, id est carbonariū falconem uocitant.





## Ordo primus.

II

**Ætalon** Aristotelis, ut eruditi quidam conijciūt.  
Recentioribus Smerillus, Smerla, Smerlus,  
Merlina, Smerlus, Merillo, Meristio.

**ITALICE** Smerlo, Smeriglio.

**GALLICE** Emerillon, Esmereillon.

**GERMAN.** Nicle/Smerlin.

**F.** Dendrofalcus, Falco arborarius Alberto.  
Fortè accipiter fringillarius ueterum.

**GERMAN.** Baumfalck/Baumfelle.





Osifraga.

Harpe.

VULTUR Alpinus, uel aureus (à colore) ut Heluetij cognominant. Tota pars supina, id est, collū inferius, pectus & uenter, & pedes quoque, ruffo colore sunt, dilutiore quidē caudam uersus, rubentioe autem uersus caput, &c. *Jacobus Dalechampius, medicus Lugduni longē doctissimus, Osifragā ueterum hanc auiem esse iudicat. Pelliones (inquit) nostri adhuc uocant un Frencau, quasi Feneau, ad emulationem Græci nominis φῆνα. Sequam uocant Briseos, Osifragam exprimentes. In uentriculo dissecti repertus est bouis os. Ex inferiore rostri parte, barba nonnihil propendet. quamobrem Aquilam barbatam olim uocauerunt. Hec omnia monstrant Osifragam esse, non Vulturem, cuius exuuiæ frequentes hic in tabernis pellionum uisuntur, à Vulturis pennis magnopere diuersæ. Hec ille. Bello-nius Osifragā suam longē aliter pinxit. Phene sue Aristoteles colorem cinereum tribuit: qui Vulturi aureo à nostris dicto non conuenit. Osifragam habere barbam, colligimus ex uerbis Plinij: Sex Aquilarum generibus (inquit) quidam adieciunt genus Aquile quam barbatam uocant, Thisci Osifragam. at φῆνα barbatam esse, Græcorum (quod sciam) nemo scripsit. Oppianus tamen, Harpe sue ceu barbam attribuit: et alia quedam que alij authores Latini Osifrage, Græci uerò Phene, φῆνα. & Grammatice quidam Græci, Harpen interpretantur Phenem. Quamobrem Dalechampij sententiæ acquiescemus, donec aliquis meliora proferat.*

GERMANICE Goldgeyr.





LATINE Vultur.

ITALICE Auoltoio.

GALLICE Vautour.

GERMAN. Geir/Asgeir/Hasen-  
geir.

F. Lanius (solet. n. dilaniare cæteras quas potest auicu-  
las) cinereus medię magnitudinis. Bellonio est Col-  
lurio Aristotelis, minor: quanquā Aristoteles nullā  
magnitudinis differentiā facit. Collyrion (inquit)  
avis est similis Merule, & eisdē cibis vescitur; magni-  
tudine uerò Pardali & Mollicipitis, capitur potissi-  
mū hyeme.

GER. Thontkrezer/Thontraer/Wünmöder.

ITAL. Regestola falconiera, Gaza speruiera, Ga-  
za marina, Passera gazera.

GALL. & Sabaudice Matagasse. Pie griayche,  
uel Pie Griefche, ut Bellonius scribit. Pie elcrayere.  
Pie ancrouelle, Arneat.



F. Lanius maior, Collurio Aristotelis maior, secundum Bellonium.

Vide quæ minori huius generis formæ adscripsimus.

GERMANICE Wartengel.

Italica & Gallica nomina eadem ei conuenire uidentur, quæ sequenti.





ORDO SECVNDVS DE AVIBVS RAPA-  
CIBVS CARNIVORIS NOCTV RNIS.

LATINE Bubo. ITALICE Duco, Dugo, Bufo.  
GALLICE Chathuant, Hibou. Duc Bellonio, uel grand  
Duc: nam alium minorem, quem Otum facit, Gallicè nominat  
Duc moyen, ou Hibou cornu. SA Baudice, Duc, Chassetont,  
Lucherant.  
GERMANICE Franck/Herzog/Berghuw/Hörn.





**LATINE** Vlula. Bellonius Vlulam auritam pingit similiter ut Bubonem, & Græcè Aegolium nominat.

**ITALICE** Vlula.

**GALLICE** Grimauld, Machette. Bellonius (ut dixi) auritam pingit Vlulam, & Gallicè nominat Hulote, uel Huette.

**GERMAN.** Vl / Eul / ūs  
uel / Huhu.



**LATINE** Noctua, uel potius noctuæ genus paruum. Bellonij Noctua digitos binos prorsum, & totidem retrorsum uertit.

**ITALICE** Ziuetta, Zueta, Ziguetta.

**GALLICE** Souette, Siuette, Zoëta, Chouette. Bellonius Noctuam aliam, ut dixi, pingit, & Gallicè Cheuesche nominat.

**GERMANICE** Kuz.



Auritæ Bellonio aues nocturne sunt, Bubo, Otus, Vlula; Gallicè, Grand duc, Hibou cornu, Huette.  
Cruribus hirsutis, Bubo, Aluco (id est, Hibou Gallicè, uel Chahuant) Vlula.  
Digitis antrorsum binis, & totidem retrorsum, similiter ut Pici, Aluco, Noctua, Vlula.

Vulæ genus alterum, quod quidam flammeatum cognominant. Hæc fortè est aut cognata auis, quã pro Caprimulgo Bellonius pinxit, & Gallicè ab horribili clamore, quem inter uolandū ædit, Effraye aut Frezaye uocari scribit: & alio nomine petit Chahuant, nam Chahuant simpliciter Aluconem suum appellat. Sed idem Caprimulgum alium & ueriores, postea ad nos misit.

ITALICE Barbaiano.

GALLICE. Lege proximè retro scripta. Gallis Cisalpinis Dama, hæc uel simillima auis.

GERMAN. Schleierül / Kirchül / Ranfulle. Crura paucis raris uel pilis uestiri debuerant.





# Ordofecundus.

17

Noctua quam saxatilem Heluetij cognominant: Latine Lagopodem cognominare licebit, ppter digitos pedū similiter ut Lepori uel Lagopodi aui alpinæ, hirsutos.

GERMANICE Steinkuz.



LATINE Vespertilio.

ITALICE Nottola.

Norula, Sportegliono, Ratto penago, Barbastello, Pipistrello, Vulpistrello.

GALLICE Souris chauue, id est, Mus glaber: uel Rattepenade, id est, Mus

GERMANICE Flädermus/Spectmauf. (pennatus.



Nycticorax, non ueterum, sed uulgò sic dictus circa Argentinam  
& alibi circa Rhenum, auis pisciuora.

GERMANICE Nachtram/Nachtrabe.



# ORDO TERTIVS DE CAETERIS AVIBVS

AEREIS SEV VOLACIEVS, QVAE RAPACES NON  
sunt, & primum de maioribus, deinde de reliquis mediæ magni-  
tudinis. Minores ad Ordinem quartum differuntur.



Ordo tertius.

19

LATINE *Gruis*.  
GALLICE *Gru*

ITALICE *Gru, Grua*.  
GERMAN. *Bran/Branich/Beye*.



Paradisī auis, uel Paradisea, ex Nouo orbe, nostri tantum  
sæculi scriptoribus commemorata.

**ITALICE** Manucodiata: quod uocabulum Indi-  
cum uel Noui orbis est, ubi Mamuco diata, id est Aui-  
cula Dei nominatur.

**GEMANICE** Paradyfuogel / Lustfuogel.





## Ordo tertius.

21

LATINE Corvus.

ITALICE Coruo, Corbo.


GALLICE Corbeau.

GERMAN. Rapp/Rab.



*Cornix caerulea* apud Misenos.

GERMAN. Wilde Holzkrae/Galgenregel/  
Halckregel/Teutscher Pappagey.



*F.* *Cornix hylaricus*, *Ibis nigra* secundum Bellonium, ni fallor. quanquam imago ab ipso exhibita, non satis cum hac nostra conuenit. *Ibidem* albam Herodoti, *Ciconiam* esse putat: cui Strabo *Ciconie* colorem attribuit, non ipsam *Ciconiam* esse dicit.

**ITAL.** Coruo seluatico, Coruo spilato, Coruo Marino.

**LOT** Haringis Corneille de mer.

**GERM.** Waldrapp/Steinrapp/Clausrapp.



*Cornix* uaria uel cinerea, marina, hyberna, apud recentiores: uel cognata ei species, colore nonnihil differens.

**ITALICE** Mulacchia uel Munacchia,

**GALL.** Corneille sauuaage, Corneille emmantelee,

**GER.** Nabeltrae/Schiltstraer/Pundtertrae, Alstraer.

Eiconem huius auis accuratiorem dedidit Bellonius: qui docet aliam *Cornicis* speciem esse, maiorem, quae rostro longiore, albo, in locis cultis grana & uermes eruat: uulgo dictam à Gallis *Craye*, (ab Anglico notè *Craye*, quod *Cornicem* etiam Germanis significat,) uel *Grolle*, (aliqui scribunt *Graille*, *Graillar*.) & *Freux*, ueluri corrupto nomine à *Frugilega*, sic enim Latinos eam uocare, Græcos *Spermo logum*. Eadem à Germanis *Nüch* uocatur.





# Ordo tertius.

23

**LATINE** Cornix. **ITAL.** Cornice, Cornacchia, Gracchia.

**GALLICE** Corneille, un petit Corbin. qui hanc auem Graye uel Grolle nominant Gallicè, cum Cornice uaria eam cōfundunt, ut admodum Bellonius.

**GERMANICE** Kräe / Krähe / Zuffkräe / Schwarzkrae.



Pyrrhocorax alpinus peculiaris est, luteo rostro, niger, Plinius.

**ITALICE** Speluier, Taccola, Pason, Zorl.

**GALLICE** Chouette, ou Chouca rouge.

**VALE** sijs qui Sabaudicè loquuntur, Choquar, Chouette: quæ tamen communia græculorum generi nomina sunt.

**GERMAN.** Alprapp / Alpkachel / Wildetul / Bergtul / Steinberg / Beena.



LATINE Graculus, Monedula, Lycos Aristotelis.

ITALICE Ciagula, Tatula, Taccola, Cutta, Pola.

GALLICE Chouchette petite, Chouca, ou Chouëtte, ut Bellonius habet,  
aliqui scribunt Chucas, Choca.

GEMANICE Tul/Dole/Zelke/Kaycke/Gacke/Tabé.





# Ordo Tertius.

25

F. Caryocatactes uel Nucifraga.

GALLICE Cassenoix.

GERMAN. Aufbrecher/Aufbretscher/Aufbicker/Aufhåher.



C

**L A T.** Graculus coracias,  
rostro & pedibus rutilis.  
Bellonius Pyrrhacoracem  
nostrum & Graculū Cora-  
ciam eundem facit: nos dis-  
tinguere uoluimus, præfer-  
tim colore rostri admonen-  
te: qui in Pyrrhacorace lu-  
teus est Plinio: in Coracia  
puniceus, Aristoteli.

**GERM.** Steintabern/  
Steintulen.



**LA TINE**

Pica glandaria.  
Pica quæ glan-  
de uescitur, Plin-  
nio. Garrulus  
recentioribus.  
Molliceps Ari-  
stotelis an sit,  
querendum. Co-  
lios, ut quidam  
putat, ὀλιός ἢ ὀ-  
λίος, essenō po-  
test.

**ITALIC.**

Gaza ghiadaia  
uel ghiandara.  
Gaza uerla.  
Berta. Ab inco-  
lis Chij, qui ex  
Genuensibus et  
Gracis mixti  
sunt, uulgò o-  
mnibus nomi-  
natur Bertina,  
hoc est cinerea,  
Bellonius.

**G A L.** Gay.

Sabaud. Gaion.

**GER.** Häber.

Hägel/ Baum

Hägel/ Häzler/

Herrenvogel/

Här/ Jäck/

Wargraff/

Marcolfus/

Holzschreier.

Brabantis Gi-

rau, Richau.





# Ordotertius.

27

Garruli uel Picæ glandariæ genus alterum, quod GERMANI circa Ar-  
gentoratum Koller appellant per onomatopœiam. Ein andere art  
des nächstgemälten Hähers.



F. Garrulus Bohemicus, uel Picæ glandariæ genus tertium.  
Quærendū an hæc sit Hercyniæ sylvæ avis, noctu ignium  
modo collucens.

GERMAN. Behemle / Beemerle / Zinzerelle / Seis-  
denschwanz / Wipstierz.



C ij

**LATINE** Pica uaria uel caudata, longa insignis cauda.

**ITALICE** Gazza, Regazza, Putta, Picha, Gazzuola, Gazzara, Ghiandara.

**GALL.** Pie, Jaquette, Dame, Agasse.

**GERM.** Negerst/Aglaster/Elster/Äzel.

**LATINE** Turdus minor, quem illadem uel tyladem cognominat, Gazallia cum uertit.

**ITALICE** Maluizo, Cion, Cipper.

**GALLICE** Mauuis, Griuette, Trasle, Tourer.

**GERMAN.** Witzel/Witze/Bergstrostel/Behemle/Bömerle/Beemerziemar/Wyntrostel/Rotrostel.





## Ordo Tertius.

29

**LATINE** Turdus simpliciter dictus, mediæ magnitudinis, Trichas Aristotelis, Gaza Pilarem uertit.

**ITALICE** Tordo.

**GALLICE** Tourd, Litorne, Oiseau de nerte.

**GERMAN.** Bramevogel/Reckolsternvogel.



C üj

**LATINE** Turdus uisciuorus, uel maior, turdela quibusdam recens  
tioribus.

**ITALICE** Turdela, Drexano.

**GALLICE** Griue. Siferre Lugduni. Sabaudis Griue sifalle.

**GERMAN.** Mistler/Mistelfinck/Ziering/Zerrer/Schnerret.

Est & altera species minor; Germanis ein Trostel, Gallis Griue petite.





# Ordotertius.

31

**LATINE** Vpupa, Epops.

**ITALICE** Buba, Vpega, Gallo de paradiso, Galletto de Magio, Pupula.

**GALLICE** Hupe, Huppe, Putput, (uel, ut Bellonius habet, Puput, per onomatopœiam,) Lupoge.

**GERMANICE** Wydhopf/ Bathan.



LA TINE Merula, quòd mera & solitaria ferè uolet.

ITALICE Merlo, Merulo.

GALLICE Merle, Merle noir.

GERMANICE Amsel/ Merl/ Zyster Hollandis.





## Ordo tertius.

33

Merula torquata, ut nos appellauimus à re ipsa, & Germanici Galliciçq; uocabuli imitatione. Bellonius aliam Merulam torquatam pingit, torque (quam tamē pictura nō exprimit) in collo fusci coloris: quam Aristotelis bæum esse suspicatur. sed in eo torquis Aristoteles non meminit, & Gaza non bæum, id est, paruam: sed phæum, id est, fuscā legit, quod laudamus. Nostri id genus à montibus sæpibusue *Birgamsel* uel *Hagamsel* denominant. Sed considerandum an potius *Passer solitarius* uulgò dictus, *Merula fusca* Aristotelis sit, quemadmodum Aug. Nipho placuit: & ante eum, Alberto Magno ut uidetur.

**ITALICE** Merulo alpestro.

**GALLICE** Merle au collier.

**GERMAN.** *Kingamsel*/ *Waldamsel*/ *Steinamsel*/ *Kureramsel*/ *Rosamsel*/ *Birgamsel*. Sed postremum hoc nomen frequentius tribuitur mesularum generi fusco, non canoro.



F. Rubecula uel potiùs Merula saxatilis. Natura & specie ferè, cantusq; suaui-  
tate Merularū generi; aut Passeri solitario, cognata uideri potest: nec non  
Cyano Aristotelis, quam Græci hodie Petrocoslyphon, id est, saxorū in-  
colam Merulam uocant: Italicè quidam, ut Ragusij, Merlo biauo, Germa-  
ni Blawvogel, colore differt.

ITALICE Crofferon circa Bellizonam, alibi (ni fallor) Corossolo, quod  
nomen ruticillæ seu phœnicuro alioqui tribuitur.

GALLICE dici potest Merle de Rochiers.

GERMANICE Steintötele/Steintöstel.



LATINE Cuculus, Coccyx.

ITAL. Cucculo, Cucco, Cuco, Cucho.

GALLICE Cocou, Coquu, uel ut quidam  
scribit, Coqu.


GERMAN. Cucker/Cuggauch/Kuffuck.

LATINE Sturnus.

ITAL. Storno, Stornello, Sturnello.

GALLICE Estourneau.

GERM. Staat/Kinderstär/Spiehe.





## Ordo tertius.

35

**LATINE** Picus maximus, uel niger, Tertia species Pryocolaptes  
Aristoteli.

**ITALICE** Pico, Picchio.

**GALLICE** Pic, Pimar, Pieumart: Le plus grand Pic uerd: ab.  
utuntur enim nomine Pic uerd ad quosuis Picos.

**GERMANICE** Holzkräe/ Holkräe/ Kräspecht/ Ein grosser  
schwarzer Specht.



**LATINE** *Picus uiridis*, *Picus arborarius* uel *arborum cauator*, *Picus Martius maior*, Bellonio.

**ITALICE** Pigozo.

**GALLICE** Piuert, Picuerd, uel Piciaulne.

**GERMANICE** Grünspecht.



**LATINE** *Picus uarius*, albo nigroq; distinctus, Bellonio *Pipra*, *Pipo*, & *Picus Martius minor*.

**GALLICE** Epeiche, Coul rouge, uel Picrouge.

**GERMAN.** Aegerstenspecht / Elsterspecht / Bunterspecht / Wyf-  
specht. Minimus inter uarios, à nostris uocatur *Spechtle* / *Grass*  
specht.





## Ordo tertius.

37

Oriolus apud recentiores quosdā, Plinio picus qui nidum suspendit in furculo primis in ramis cyathi modo. Bellonio Gulgulus, Icterus, Chlorion, Colios.

ITALICE Becquafiga, Brusola, Galbedro, Garbella.

GALLICE Lorient, Orio.

GERMAN. Witterwal/Widwal/Bierolff/Brüder berolff/Gerolff/Byrolt/Tyrolt/Kerssenryfe/Goldmerle/Olimerle.



F. Picus cinereus uel subcæruleus, Sitta fortè Aristotelis,

ITAL. Ziollo circa Bellizonam prope Alpes.

GALL. Torche pot, ab artificio nidi è terra pingui tanquam à figulo facti: uel grand Grimpereau. Bellonius alteram quoque speciem eius minorem inueniri tradit. Vide mox in Certhia.



GERMAN. Chlän/Tottler/Kottler/Unfbicker/Unfhäcker/Blauwspöchtel/Baumhecker/Kläber/Meyspecht.

Certhias uel Certhius Aristotelis, nisi quis Cnipológon eiusdè esse maslit, Scandulaca Latine uel Reptitatrix uocari potest. Turnerus uidetur Cnipológon lyngem nostram facere. Presentem uerò auiculam, Picorum formæ respōdere negat, & rostri teneritudinem ut Picorum albo adscribatur, non pati.

GALLICE dici potest petit Grimpereau: quanquam Bellonius auiculam sic dictam Gallice aliter pingit, Certhiam Aristotelis & ipse faciens. Proximè quidè ante exhibitam auem Galli grand Grimpereau uocant.

GERMAN. Baumkletterlin/Ximmentläber: melius fortè Xindentläber dicens da, quod corticibus arborum adhæreat.



**LATINE** Iynx, Torquilla, Turbo.

**ITALICE** Collotorto, Stortacoll, Capetorto, Vertilla, Formicula.

**GALLICE** Tercot, Turcot, Torcot, Tercou, Torcou.

**GERMAN.** Windhals/ Naterhals/ Naterwendel/ Nas terzwang/ Trächals/ Krinitz.



**F.** Picus muralis. **SABAVDIS** circa Neocomum Pitschat.

**GALLICE** Pic de muraille; uel Eschelette, Ternier, apud Aruernos.

**GERM.** Murspecht/ Klätterspecht.



**Pittacus** quem erythroxanthum distinguendi gratia cognominare uisum est.

**GERMANICE** Einrotgelber Sittich.





## Ordō tertius.


39

**LATINE** Psittacus, Psittace. Sunt autem species huius generis diuersæ. Psittacum illum cuius hæc figura est erythrocyænum nos à præcipuis coloribus cognominamus.

**ITALICE** Papagallo,

**GALLICE** Papegay, Papegaut, Perroquet.

**GERMAN.** Sittich/Sickst/Pappengey.



**ORDO QVARTVS DE AVIBVS VO-**  
lacibus siue Aëreis minoribus, frugiuoris pri-  
mum, deinde uermiuoris.

D ij

Coccothraustes Græcè, Latinè Ossifragus dici poterit, quod officula cerasorum cōfringere soleat ut nucleis uescatur. Sed longè alia est Ossifraga Aquilarum generis. Hic fortè est Pardalus Bellonij, quamuis colore differt. sed ipse etiam pro ætate colores eum uariare scribit.

ITALICE Frison, Frusone, Grison, Franguel montagno.

GALLICE Choche pierre: eadem fortè quæ Grosbec & Pinson royal à Bellonio dicitur.

GERMAN. Steinbysser/Klepper/Kernbeiß/Kirpsfinck/Kirseschneller/Bollebick.



F. Loxias uel Curuirostra.

GERMAN. Crüzvogel/Krümschnabel.





# Ordo quartus.

4

**LATINE** Passer.

**ITALICE** Passara,  
Celega.

**GAL.** Moineau, Mou  
cet, Passe, Paiste, Moif  
son, Passereau, Passer  
rat.

**GERMAN.** Spar/  
Spatz / Hufspat/  
Sperck / Sperlintg/  
Lünnitg.



Passeris species quā GER  
MANI uocāt Gaulam  
mer / Gollammer: aliqui  
Emmerling similiter ut p  
ximè sequentem auem.



Passeris species alia, fortè passer spermologus ueterum, nos Ger  
manici uocabuli imitatione Emberizam flauā nominauimus.  
Vide mox in Gallicis nominibus.

**ITALICE** Cia, Megliarina, Verzerot, Paierizo, Spaiarda.

**GALLICE** Bruyan, Verdun, Verdrier, Verdereule, Ver  
dere. Sed hoc postremum alij chloridi nostræ attribuunt, Bel  
lonij Anthus hic uidetur, quem à Græcis hodie Latino nomi  
ne Florum appellari scribit. Gallicum nomen unum duntaxat  
ponit, Bruant, à uoce factum.

**GERMAN.** Embrig / Emmeritz / Emmering / Emmer  
ling / Gilbling / Silberschen / Kornvogel. Geelgoest. Aliqui  
hanc quoq; (ut alij superiores) uocant Goldammer.



F. *Emberiza alba*, uel potius *Spermologus albus*. superiorem  
differentiæ gratia flauum cognominabimus.

ITALICE *Cia montanina*, ni fallor.


GERMAN. *Wyſſe Emberiz*.



F. *Emberiza pratenſis*.

ITALICE *Ceppa*, circa lacum Verbanum.

GERMAN. *Wiſemmerz*.



F. *Prunella*.

•GALL. Hæc fortè eſt auicula,  
quam Bellonius Gallicè uocat  
petit Mouchet aut Mouche-  
relle, & Latinè *Paſſerem rubi*  
(aut ſepiù) uocari poſſe putat.

GERM. *Prunell*.





**LAT.** Carduelis, Thraupis Aristotelis: & fortè Acanthis recentiorum Græcorum, quam et Phœcilida (id est, Variā) uocat. Zena, & Altragalinus Græcis uulgò. Aristoteles Pœcílides & Alaudas inimicas facit, et oua in uicem deuorantes. Nostra quidē Chloridis ueterū species altera, Bellonij Thraupis uidetur.



**ITAL.** Raparino, Rauarino.

Vel potius Gardello, Gardellin, Gardelino, Cardellino, Carzerino.

**GALLICE** Chardonneret, Sabaudis Charderaulat.

**GERMAN.** Distelfinck/Distelnvogel/Stigeliz, Frisij Petter.

**F.** Linaria, Ruellius Miliariam uocat. Columellæ quidē et Varonis Miliaria, alia maior uidetur auis fuisse, milio saginari solita: ea (ut coniicimus) quam Itali Bononia Hortulanū uocant. Linariam nostram Bellonius Aegithum Græcorū esse putat, Salū Latinoꝝ rum: alij uerò sequentem, proximè auiculam.



**ITALICE** Fohonello, Fanello, Canuarola.

**GALLICE** Linotte, uel Picaueret. Sabaudis Lynnette.

**GERMANICE** Lynfinck/Schösslin/Henffling/Flachsfink. Frisij Rubin.

**F.** Linaria rubra, Aster fortè Oppiani, nisi ea Carduelis sit.

**ITALICE** Finett, circa Lacum Verbanū.

**GALLICE** dici poterit, Linotte rouge.

**GERMAN.** Schösserle / Stockhenffling/Tschütscherle. Eruditi quidam hanc ueterum Aegithon seu Salum esse putant: & Germanicè interpretantur Zötscherlitt. Bellonius uerò auiculam proximè retrò positam, Aegithum facit.



**LATINE** Fringilla uel Fringilla.

**ITALICE** Franguello, Frangueglio, Fringuello.

**GALLICE** Pinson, Grinsson, Quinsson.

**GERMAN.** Finck / Kotsfinck / Büchfinck.



**LATINE** Fringilla montana.

**ITALICE** Franguel montagno, quod tamen nomen alij etiam alijs auiibus attribuunt.

**GALLICE** Montan, Montain, Pinson d'Ardenne. Alii qui nō rectē Passerem sylvaticū uocant, Païsse ou Moineau de bois.

**GERMANICE** Waldfinck / Thausfinck / Schneefinck / Winterfinck / Kowert.




**Acanthis** Aristotelis, Gaza Spinum & Ligurinum transtulit.

**ITALICE** Lugaro, Lugarino, Legora, Legorin, Luganello.

**GALLICE** Scenicle, Cerisin, Cinit.

**GERMAN.** Zinsle / Zeisel / Zysle / Zysche / Gälugel / Sissgen.



**F.** Citrinella, Chloridis ueterum species. Bellonio hæc Thraupis Aristotelis est, nos Carduelis uulgò dictam, Thraupidē appellamus.

**ITALICE** Citrinella, Lequila.

**GALLICE** Tarin, per onomastopceiam, Tirin.

**GERMAN.** Citrynle.





# Ordo quartus.

45

**F.** Serinus, Chloridis ueterum species alia : quæ Gallis & Italis Serin, quasi Siren quædam, à dulcedine cantus uocatur. Bellonius hanc Acanthidem, hoc est, Spinum seu Ligurinū facere uidetur.

**ITALICE** Serin, Scartzerino.

**GALLICE** Serin, Cedrin.

**GERMAN.** Sâdemle/Schwâderle/Girlitz/Grill/Zirngrill.



**Chloris Aristotelis, Gaza Lutea & Luteolam uertit, malim ego Viridiam.**

**ITALICE** Verdon, Verderrero, Verdmontan, Zaranzo, Tarato, & Frinon circa Tridentum.

**GALLICE** Verdier, Verdier de haye, Serrant, ut Græcis alicubi uulgò Asarandos. Sabaudis Verdeyre: quod nomen etiâ passeris spermologo nostro à Gallis attribui puto.



**GER.** Grînling/Grînfinck/Kuttuogel/Tutter/Kappuogel/Zirpûogel.

**LAT.** Parus uel Aegithalus maior, Fringillago Gazæ.

**ITAL.** Parisola, Parussola, Parisola domestica, alicubi caponegro, & circa Alpes tschirnabó. Priora duo ex his nomina parorum generi cõmunia sunt: Caponegro atricapillæ seu ficedulæ potius attribuendum est.



**GALL.** Mefange, uel Nonnette. Sabaudis Maienze.

**GERM.** Spiegelmeiß/Großmeiß/Brandmeiß/Kolmeiß aliquibus. nostri enim de minore paro uerticis nigri hoc nomē efferunt.

**Parus caeruleus uel minor hic cognominari potest, Aegithali terria species Bellonio.**

**ITAL.** Parussolin, Parozolina.

**GALL.** Marengo, uel Mefange bleue.

**GER.** Blauweiß/Bymeisse/Pimpelmeiß/Meelmeiß.



Parum atrum appello, quem pleriq;  
Germani *Kolmeiß*, id est parum  
carbonariū nomināt: quanquam  
etiam parū maiorem Saxones &  
aliq quidam similiter appellant.



*Parus sylvaticus* hic à nostris dicitur.

GERMAN. *Waldmeiße/Thaß-  
meiße/* & à uoce *Zilzelperle*. Aliqui mi-  
nus propriè *Waldzinße* uocant.



*Parus palustris* uulgò dictus. no-  
stri hunc carbonarium uocant:  
quod nomē aliq paro maiori, a-  
liq minori, quē paulò antè aurū  
appellauimus, attribuunt.

GALL. Videtur hæc etiā auis  
cula post cæteros paros à Bello-  
nio describi, sed nullo peculiari  
nomine Gallico.

GERMAN. *Märmeiß/Kiet-  
meiß/Keitmeiß/Äschmeißle/  
Kaatmeißle*. Nostris *Kolmeiß*.



*Parus cristatus* uulgò.

GALLICE *Mefange hupée*.

GERMAN. *Kobelmeiß/  
Strußmeißlin/Heubelmeiß/  
Heidenmeiß*.





# Ordo quartus.

47

Parus mōticola Aristotelis, ut cōjicio,  
nostri caudatū nuncupāt, quod caus  
dæ lōgitudine paros ceteros excedat.

GALLICE Melange a la longe  
queue.

GERM. Schwanzmeiße/Pfan  
nēstil/Berckmeiße/Zagelmeiß/Psā  
nenstiglitz.



LATINE Curuca, uel Curruca per duplex r. Sub hoc genere etiam  
ficedulas & atricapillas comprehendo. Bellonius Ficedulam facit.

ITALICE Pizamosche, Becquetigo, Piccafiga, Capo nero,  
Testa nera, Sartagnia.

GALLICE Becquefigue, Papafigho.

GERMANICE Graßmuck/Schnepffli/Wüßling. Es sind  
jren III. oder V. vnderscheid/vnder welchen sonderlich der  
Schwarzkopff oder Münchlein (in Saxon) genennet wirt.



Currucis seu ficedulis cognatam  
hāc quoq; auiculam dixerim,  
quā circa Argentoratū uocāt  
ein Bürstner.



**LATINE** Luscinia, Philomela etiam Latinis quibusdam. Nam Græci plerique Philomelæ nomine hirundinem intelligunt.

**ITALICE** Rosignuolo, Roscignolo, Ruscigniuolo, Luscigniuolo.

**GALLICE** Rossignol, Roussignol.

**GERMAN.** Nachtgall.



Erithacus Aristoteli, Rubecula Gazæ. Hanc autem hodie plerique à rubicundo pectoris colore denominant.

**ITALICE** Petto rosso, & per syncopen petusso: Peccietto, Pechietto, Ferbott.

**GALLICE** Rubeline, Gorge rouge, Berée: aliquibus etiam Gadrille, Roupie. Saubaudis, ni fallor, Rouge bourse.

**GERMAN.** Rôtele/Winterrôtele/Kotbrüßle/Waldrôtele/Kottröpflein/Kotfelchyn.



**Phoenicurus** Aristoteli, Rutililla Gazæ.

**ITALICE** Reuezôl, Corossolo.

**GALL.** Roussignol de mur, Roussignol de muraille.

**GERM.** Zuprôtele/Sunier/rôtele/Kotschwenzel/Kotzâgel/Kotstierz/Wynuögele.



**Phoenicuri** species altera: Pyrrhulas fortè Aristotelis, quam Gazæ Rubicillam interpretatur.

**GERMANI** circa Argentoratū uocant Kotchwenzel/ quod tamen nomē ab alijs plerisque superioribus tribuitur.





# Ordo quartus.

49

**F. Rubrica.** Pectore inter aues hæc una maxime omniū ruber, Bellonio hæc est Sycalis seu Ficedula, & alio nomine Melanocyphus, id est, Aticapilla.

**ITAL.** Suffuleno, Franguello montano, (quāvis & aliæ quædam fringillæ montanæ uocantur,) & alicubi circa Alpes Franguel inuernengk, id est fringilla hyberna.

**GALL.** Piuoine, Sisleur, & Groulard, sed postremum hoc potius debetur alteri auiculæ, quam Batidem Aristotelis Bellonius putat. Lotharingis Pion.

**GERMAN.** Gügger/Blätsfinck/Goldfinck/Gätsfinck/Bronseffer/Bollensbyffer/Rotvogel/Sail/Goll/Gympel/Gumpel/Thumherr/Thumpfass/Pfäfsfin/Quecker/(Das wyble/Quefsch/)Pilart.

**LATINE** Regulus, Trochilus, Rex, Senator, Basiliscus, Bellonius Troglodyten nostrum, cuius icon statim sequitur, pro Trochilo & Rege auium pingit: & Roytelet quoque nominat Gallicè, hunc uerò nostrum Regulū, facit Aristotelis Tyrannum; quem Aristoteles paulò maiore cica-da esse scribit, crista punicea, noster hic non cristam, sed maculā auream, nō puniceam, in uertice gerit.

**ITALICE** Reillo, Regillo, Scricciola, Reçino, Reatin, Fior rancio.

**GALLICE** Rottolet, Roytolet, Petit roy, id est Regulus, ab alijs Poul, quòd propter paruitatē semper pullus appareat. alijs Sourcicle, uel melius Soulcie, quòd plumas nigras supra oculos ceu supercilia gerat.

**GERMAN.** Goldhendlin/Strüpfle/Ochsenengle. Sed pleraque hæc nomina in diuersis linguis à rege denominata, passerē troglodyten potius significant, quem cum regulo multi confundunt.

**LAT.** Passer troglodytes. Bellonius quidē iogē aliū Troglodyten facit, auiculā Phœnicuro ualde similē, multò minorē, corpore oblongo: Gallicè dictam Fouette rouffe, ab eo quòd foueas intret, & ruffo colore sit. Sed nostrum Troglodyten uerū esse ex Aëtij descriptione perspicuum est.

**ITALICE** Reillo, &c. uide superius in Regulo. Perchia chagia (ni fallor) Siculis,

**GALL.** Béurichon, Farfonte, Contafasna, Rebetre, Roy, Rezeto, Redoyell. uide supra in Regulo. Bellonio Roytelet, Bœuf de Dieu, & Berichot.

**GERMAN.** Zunschliffle/Thurkdnick/Schnytünig/Zuntünig/Nesseltünig/Wintertünick/Menftdnig/Dumeling.



Passerculi genus solitarium, cuius nomen nobis incognitum est, nisi quod aucupes quidam nostri nominât *Todtenyſgele/Flügensſtſcherle*, id est, *Myiocopō*. In arboribus & syluis semper irrequietum muscis uiscitat. Batidem Aristotelis esse cōiectat Bellonius, cui à batis, id est uepribus nimirum impositum est nomen.



**GALLICE** Traquet, Groulard, Tarrier. Nomen quidem Groulard, etiam proximè antè depictæ *Atricapillæ* Bellonij quidam tribuunt.

Auicula Argentorati dicta *Wydenyſcherle* / minima est : colore partim fusco, partim subflauo, &c. Nostri *Wyderle* / quod salices amet, quâuis aquatica non sit: & *Zilsepſle* / à uocē, Latine *Salicariam* dixeris.



Ibidem auiculam muscis uiscitantem appellant *Guckerlin / Gickerlin / Grienuſgelin*. Latine si libet, *Glareanā* uocemus. Est enim glareā Latinis, quod *grien* Germanis : hoc est minutissimi lapilli & arenæ in ripis ac litibus.



Est & quæ *Güntel* dicitur ibidē, gregaria auis, & seminibus uiscitans, pectore rubicundo uel rubicæ colore : ad Passeres nimirum referenda, uel rostri specie.





Avis quam circa  
Argentoratum  
Wegflecklin no-  
minant, magni-  
tudine & specie  
Phoenicuru seu  
Erithacum refe-  
rens, sed pectore  
caeruleo, &c.



LATINE Hirundo.

ITALICE Rondine, Rendena, Rondena, Rondinella, Cesila, Zisila.

GALLICE Harondelle, Hironnelle petite.

GERMAN. Schwalim/Schwalbe/Husschwalim.



LATINE Cypselus, Apus: Gaza apedes & depedes dixit.

ITALICE Rondone, Biui, Dardano.

GALLICE Martinet, Martelet, La grande hirondelle, grand Mar-  
tinet, Moutardier.

GERMAN. Spyr/Spyrschwalb/Gerschwalm/Geyrschwalb.



**LATINE** Hirundo rustica cognomine, uel agrestis, uel syluestris. Drepanis uel Riparia Bellonio, ut suspicor, Potest & Apus minor uocari, uel Cypselus minor, nam superior, maior est.

**GALL.** Petit Martinet, Hirondelle de riuage Bellonioni fallor.

**GERMAN.** Murspyr / Münster-spyr / Kirchschwalb / Murschwalb / Bergschwalb / Wyßer spyr.



**ORDO QVINTVS DE TERRESTRIBVS SEV HVMI-**  
uolis auibus, quæ pulueratrices sunt: & primum de mansuetis: quibus & columbas adnumeravi ex sententia Aristotelis, etsi Gyb. Longolius columbas inter aues pulueratrices rectè numerari non putat,

**LATINE** Gallus, uel Gallus gallinaceus, & Gallinaceus seorsim.

**ITAL.** Gallo.

**GALL.** Cocq, Gau, Geau, Gal, Cog.

**GERM.** Han/Hausphan/Gal/Güggel.





# Ordo quintus.

53

LATINE Gallina, Gallina uillatica uel uillaris.

ITALICE Gallina.

GALLICE Geline, Poule.

GERMANICE Henn/Hän.



鷄 母

LATINE Capus, Capo.

ITALICE Capon, Capone.

GALLICE Chappon.

GERMAN. Kappun/Kapaun/Kaphan.



Gallina lanigera, in regno Mangi, ex Charta quadam Cosmographica.

GERMAN. Ein stömbder Han/hat wollen nit säbern.





Ordo quintus.

**LATINE** Pauo, Pauus; foemina priuatim Paua Aufonio.  
lunonis auis, ales lunonia.

**ITALICE** Pauon, Pauone, Pagone,

**GALLICE** Paon.

**GERMAN.** pfaw. Saxonice pagelân.



F. Gallopauus. Auis est Gallinacei generis, non pauonini; neq; aliud cum pauonibus commune habet, quàm caudæ explicationem. quare aliqui non rectè pauonem Indicū uocitant. Aelianus de animalibus 16, 2, Indicū gallinaceū nominat. Meleagridum generi cognata uidetur auis. Bellonius hanc ipsam, Meleagridem putat: uel Gibberam (gallinam) Varronis. Meleagrides, hoc est, gallinarum genus gibberum, uarijs sparsum plumis, &c. Plinius. Nos paulò post aliam Meleagridē dabimus, (quam Bellonius Gallinam Africanam seu Numidicam facit,) cui crura sine calcaribus, & alia ex Clyti descriptione conueniunt. Bellonius huius generis marem cum calcaribus pingit, fœminam absq; illis; & à Ptolemæo in penultima tabula Asiæ, Pauonem Asiæ nominari scribit. Varro & Plinius Gallinam Africanam à Meleagride non distinguūt. Grandes, uarias, seu uarijs sparsas plumis, & gibberas esse scribunt. Columella uerò distinguūt: Africana Gallina est (inquit) quam pleriq; Numidicam dicunt, Meleagridi similis, nisi quòd rutilam galeam (*forè paleam*) & cristam capite gerit: quæ utraq; sunt in Meleagride cærulea. Tranquillus etiā Meleagrides à Numidicis separat, Martialis Numidicas guttatas dixit. Clytus scribit magnitudinē ei esse gallinæ generosæ, caput parū & glabrum: in quo crista carnea, dura rotundaq; clauis aut paxilli instar emineat, colore lignū referens. Ad malas ab ore orta caruncula longa, barbæ (palearū) loco dependet, rubicundior quàm in genere gallinaceo. barbam autē mentūmue in gallinis dictum, quod rostro adhæret, non habet. Corpus nigrū, maculis plumarum candidis, frequentibus, lente maioribus, distinguitur, sunt autem orbiculi isti in rhombis nigris. Crura sine calcaribus: fœminæ maribus tam similes, ut uix dignoscas. Sic ille.

ITALICE Gallo d' India.

GALLICE Coc d' Inde.

GERMAN. Ein Indianischer oder Kalekuttischer han.





## Ordo quintus.


57

**LATINE** Columba vulgaris, uel domestica. Albæ propriè sunt domesticæ: ille uerò quibus niger color in alis accedit, turricolæ uel saxatiles cognominantur, in quo genere etiam Oenades seu Vinagines sunt, maiores albæ: eas Galli Pigeons Fuyards appellant. Rondeletius aliam auem Oenadem facit, de qua infra. Tertium genus ex duobus superioribus mixtum, Misellum aut gregale cognominari potest, Bellonius.

**ITAL.** Columbo, Columba, Colomba, Puniono, Palumbo etiam aliquibus.

**GALLICE** Coulon, Columbe, Pigeon priué.


**GERMAN.** Tub/Taube/Zame taube.



Columba Anglica uel Russica, Palumbus cicur.

**GALLICE** Pigeon paté.

**GERMAN.** Zame schlagtub/Welsche tub/Gehöflete tub.



**ORDO SEXTVS DE PVLVERATRIBVS FERIS**  
seu syluestribus, maioribus primum, quæ ferè gallinæ  
cei generis sunt; deinde minoribus.

F. Vrogallus simpliciter, uel Vrogallus maior, Videtur autem Tetraon Plinij, Bellonius etiam Tetraonem uel Erythraon nominat, Otidem uerò uel Tardam, facit alteram Tetraonis speciem hanc. Gallus syluestris uel montanus maximus.

ITALICE Cedron, Gallo Cedrone, Gallo seluatico; Stolzo, Stolgo, Stolcho.

GALL. Apud Sabaudos & Aruernos, Coc de bois, Faïfant bruyant.

GERMAN. Oihan/Oihän/Zwerhan/Pirchhän/Grosser bergfasan.



Vrogalli minores in Septentrione duobus aut tribus mensibus sub niue sine cibo latitant, quod Olaus Magnus testatur, ex cuius Tabula Oceani Septentrionalis hanc iconem mutuati sumus olim, priusquam Vrogallum utrūq; ad uiuum depictum haberemus.





# Ordo sextus.

59

F. Vrogallus minor. Tetraon minor.

ITALICE Fasàn negro, Fasiano alpestre, Gallo alpestre.

GERMAN. Laubhan/in Heluetia: alibi (ni fallor) Bromhan.  
Kleiner bergfasan.



F. Grygallus maior, ut nos uocamus per onomatopœciam, & Germanici uocabuli imitatione. Eadem aut prorsus cognata uidetur Bellonij Attagen: ipsa etiam in altis tantum montibus degens, apud Hispanos, Aruernos, in alpibus & alibi, maior quam Gallina rustica: similis feræ Canæ petieræ Gallorū, sed minor. Colore ut plurimum eodem est, (illum quidem non exprimit:) inuenitur tamen etiam tota candida, ita ut à Lagopode sola magnitudine discernatur. A Græcis hodieq; Taginari uocatur.

GALL. & ITALICE Francolino; quanquam id nomen Itali quidam etiā Gallinæ rusticæ tribuunt, ut circa Brixiam.

GERMAN. Grûgelhan/in Alpibus Heluetiæ.

Ab hoc non differt Grygallus minor, quem Alpium nostrarum incolæ uocant ein Spilhan: nisi quòd dimidio ferè minor est, nempe sesquialter ad Gallinam rusticam, quam à corylis Germani denominant, comparatus; ad quam Grygallus maior triplus est.





# Ordo sextus.

61

**L A T.** Meleagris, Gallus Numidicus uel Mauritanus syluestris. Afra auis, Horatio.

Gallina Africana seu Numidica Bellonio. Plura lege suprâ in Gallo Pao, pag. 56.

**G A L L I C E** Poulle de la Guinée.

**G E R M.** Ein fremder wilder han vñ Africa oder Barbarien.



Aliud Galli syluestris genus in Scotia, quod indigenæ uocant ane blak cok, hoc est gallum nigrum; fœminâ uerò quæ magnitudine inferior & colore dilutior est, ane grey hen, hoc est gallinâ fuscâ. Eadem fortè auis est quam Turnerus uocat Anglicè Morheñ, & Hethcok,




Scoti hunc Gallum palustrem uocant: sua lingua, ane mwyre co: quod nos, pferremus ein März han. Haud scio an eadem sit Gyb, Longolij Gallina palustris quâ Germanicè uocat Rûthenn.



LAT. Phasianus,  
GALL. Faïfant,

ITAL. Fasan, Fasano, Fagiano.  
GERM. Sasan/Sasian/Sasant.



Bellonius suum Phasianum nec capite  
cristato pingit; nec cauda tam long  
ga, sed eâdem qua corpus eius, colo  
ro & capite demptis, longitudine,  
&c. In descriptione quidē duo Pha  
sianorum genera, sicuti & Perdicū,  
inueniri scribit: & in utriusque ca  
pite binos ē plumis apices spectari,  
quos tamen cum libuerit, demit  
tant.



## Ordo sextus.

63

**L A T I N E** Attagen, ut quidā putant, Recentioribus qui Latine balbutiuerunt Bonosa, Alberto etiam orix, ineptē. Bellonius aliam Attagenē facit, eam scilicet auem aut cognatam, quam supra Grygallum appellauimus, Hanc uerò Gallinam rusticā uocat, de qua scripserit Varro: Gallinæ rusticæ sunt in urbe raræ, nec ferē mansuetæ sine cauea uidentur Romæ: similes facie non his uillaticis gallinis nostris, sed Africanis aspectu & facie contaminata. In seruitute non fœtant, sed in syluis. Ab his Gallinaria insula in mari Ligustico dicta est.

**I T A L I C E** Francolino, ut circa Brixiam uocant; Pernis alpedica, Perdice alpestre, Fasanelle, Sed Francolini nomen alteri potius aui debetur, nempe Attageni.

**G A L L I C E** Gelinette sauuage, Perdris de montaigne: Lutetia (quò aliquando ex Arduenna sylua adfertur, Gellinote de bois, Præfertur Phasianis: & una auis aliquando duobus numis aureis uenit,

**G E R M A N.** Haselhûn.




**L A T.** Perdix maior, rostro & cruribus rubris; Perdix Græca.

**I T A L.** Coturnis, Chotronisse, Pernisso, Pernisa. Græci etiam hodie Italos imitari Cothurno uocant.

**SABAVDIS,** Perdris gaye, uel gaille, uel gaule. Perdris aux pieds rouges, Pernisse. Eadem uideretur Gallorum Perdris cognomine franche uel rouge, nisi duplo ferè minor esset.

**G E R.** Rothhûn/ Rottabhûn/ Welsch râbhûn/ Pernisse/ Parnisse.



**L A T.** Perdix minor (uel fulua, Bellonio.) Auis externa Plinio.

**I T A L.** Perdice, Pernissette, Pernigona, Starna.

**G A L L.** Perdris, Perdris gringette ou griêche, Perdris des champs, Perdris grise, Perdris goache, (aliàs gouache, uel goiche.)

**G E R M A N.** Râbhûn/ Dâldhûn.



**L A T.** Lagopus uaria, colore tantum (ut uidetur) â sequeute differens, Perdices alpinae etiâ uocari poterunt, hæc uaria; quæ sequitur, candida.

**I T A L.** Otorno (ni fallor) circa Tridentum, circa Verbanum lacum Colmestre.

**G E R M A N.** Steinhûn.

Est præterea Perdix Damascena (quâ Bellonius pingit ac describit, ) uulgari Perdix nostra minor: cruribus hirsutis usq; ad digitos pedum, ut Terracon & Attagen. colore per collum ac dorsum gallinaginis siue scolopacis. alarum uerò color uariis est, &c. sub alis & uentre albicat. cauda breuis est. corques diuersis coloribus in pectore. Alia denique est Syroperdix, nobis adhuc ignota, corpore nigro, rostro rubro.





## Ordo sextus.

65

**LATINE** Lagopus, cui pedes leporino uillo insignes nomen hoc dcdère, cætero candidæ, columbarum magnitudie, teste Plinio. Inuenitur & Attagen totus candidus, ita ut sola magnitudine à Lagopode discernatur, ueluti minore, ut refert Belionius.

**ITALICE** Vrblan, Rhoncas, Herbey, Perdice alpestre, Perdice blanche de la montagne. **GALLICE** Perdrie blanche de Sauoie, Arbenne.

**GERMAN.** Schneehûn/ Schneenogel/ Berghûn/ Wyftrâbhûn/ Wyf wildhûn/ Steinhûn/ Schrazhûn Hæcauis Attageni congener est, ut Bellonio uidetur.



**LATINE** Palumbus uel palumbes minor. Liuiā columba, ut Gaza ex Aris  
storele uertit, Græce Phaps, uel Pelias oxytonum.

**ITALICE** Palumbella.

**GALLICE** Croiseau, à cauernis: & Bifet à colore, ut pain bis.

**GERMAN.** Lochtub/Kleine wilde tub/Holztaub.



**LATINE** Palumbus maior (quan-  
uis iēon hęc per negligentiam minor fa-  
cta est) uel torquatus. Græce Phatta.

**ITALICE** Torquato, Ghiandaria,  
Colombo fauaro, uel fauacco: Tudon,  
alibi Colombo butaracco, à uoce.

**GALL.** Coulon ou pigeon ramier, (à  
ramis arborum puto quibus insidet:)  
Manfart.

**GERMAN.** Ringeltub / Schlag-  
tub/Grof Holztaub/Plochtub. Flandris Kriefdune.



**LATINE** Turtur.

**ITALICE** Tortore, Tortole, Tortora,  
Turtura.

**GALLICE** Turtrelle, Tourte, Tourtes  
relle, Tortorelle.

**GERMAN.** Turteltub/Turtel.



*Oenas Aristoteli, Gaxe Vinago, ut Rondeletius conijcit. Alchata Arabicè. Rondeletio iuēs potius nominanda uidetur hæc avis quam exhibemus, à fibris quas Greci iuēs nominant. ita enim fibrosa & dura est, ut neq. edi, neq. ad cibum parari, nisi detracto tergere, commodè possit. gregalis est, simillima Perdici, & c. cruribus, ni fallor, anteriori parte tibiae ad pedem usq. hirsutis, ut pictura præ se fert. Bellonius aliam Oenadem facit, ut supra in Columba domestica dictum est. Similis huic aui & cognata, Cana petiera uulgò Gallis appellata, uidetur: colore differt. Canam quidem illam Bellonius pingit ac describit, putatq. Otidi siue Tardæ aui affinem esse, ita ut magnitudine ferè tantum differre uideatur. quamobrem Otis minor appellari poterit: hæc uerò Rondeletij Inas, Otis minor altera.*

**GALLICE** Angel circa Monspessulum,

**GERMAN.** Ein vogel im Tütschland vnbekannt: bedunckt mich der art der Trappen etwas ähnlich/möchte ein kleiner Trapp genennt werden.



*Otis Aristotelis. Recentiorum Tarda uel Bistarda. Nemesiani Terrax uel Tarax. Tetraonis altera species Bellonio, sed multum sanè differt à Terraone uero, hoc est, Vrogallo nostro. Huic Canam petieram uulgò à Gallis dictam, cognatam esse conijcit Bellonius: uide qua annotauimus ad auem proximè præcedentem.*

**ITAL.** Starda, **GALL.** Oustarde, Ostarde, Houtarde, Bistarde.

**GERMAN.** Trapp/Trappgans/Ackertrapp.






F. Trochilus terrestris (uel Rallus terrenus) ad differentiam eius qui circa aquas uicinat, nomen Trochili à celeritate cursus indidimus: alius quidem longè est Trochilus, qui alio nomine Regulus dicitur, &c. Alius esse uidetur Rallus terrenus Bellosi, ut supra in Ortygometra diximus.

GALLICE Vne sorte du Rasle.

GERMAN. Hegggeschär/Eggenschär.



# Ordosextus.

69

**LATINE** Struthio, Struthocamelus, Struthio Africa, Struthio Libycus,  
Struthiocamelus.

**ITALICE** Strutza.

**GALLICE** Austrouche, Autruche.

**GERMAN.** Struß/Strauß.



**LATINE** Alauda, Alauda non cristata uel gregalis.

**ITALICE** Allodola, Allodetta, Lodola, Lodora,

**GALLICE** Alouette. Quæ Calandra apud Gallos uulgò dicitur, Alauda nō cristata maior est, nomine (ut uidetur) à Grego Corydalis detorto.

**GERMAN.** Lerch/Heidlerch/Sanglerch/Himmellerch/Holzlerch.



**LATINE** Alauda cristata uel terrena, Galerita, Cassita.

**ITALICE** Lodola capellura, Chapelina, Couarella, Ciperina.

**GALLICE** Cocheuis.

**GERMANICE** Heubellerch/Wäglersch.





# Ordo sextus.

71

**LATINE** Ortygometra: cuius iconem à clarissimo medico Aloysio Munda della ex Italia accepimus. Bellonius quavis autem Italiae Re de qualie dicta Ortygometram esse putat, paulò aliter tamē eam pingit: rostro præsertim longiore & di rectiore, &c.



**ITALICE** Re de qualie, id est, Rex coturnicum.

**GALLICE** Rasle, Ralle, aliqui circumloquuntur, Le roy & mere des cailles. Rallæ quidem nomen etiam alijs similibus avibus tribuitur. Bellonius Rallum (Rasle masculino genere) alium terrenū facit, qui circa genistas degat, colore subrubro, rostro breviori, rariorem; quem Ortygometram alteram nominat, alium circa aquas degentem, crebriorem, rostro binos digitos longo, cætera similem, sed colore nigricante, quem simpliciter Ortygometram vocat. Gallicè Rasle noir; ut illum Rasle rouge, ou de genet; genistarum enim & huiusmodi fruticum seminibus vescitur, Rusticula uel Rustica Perdix Martialis fortè, ex illius coniectura.

**GERMAN.** Der Wachtlen künig in Italia geneßt. Ein freisider vogel den Wasserhünereu glych: flügt im Herbst mit den Wachtlen hin.

**LATINE** Coturnix. Recentioribus Qualea & Quiscula.

**ITALICE** Quaglia, Quallia.

**GALLICE** Caille.

**GERMAN.** Wachtel. Flandris Quackel.



## ORDDO SEPTIMVS DE AVIBVS AQUATICIS

Palmipedibus: quæ uel in aquis natant, ut Anatum & Mergorum genera:  
uel circa aquas uolitant, ut Lari & aliæ quædam. His adduntur etiam  
non palmipedes, sed circa aquas uolare solitæ, ut ripariæ.


PARS I. Depalmipedibus, quæ in aquis natant.

LATINE Anser ferus, eius generis quod sub initium hyemis sub-  
limi uolatu gregatim migrat.

ITALICE Ocha saluaticha.

GALLICE Oye faulnage.

GERMAN. Wilde gans/Schneegans.




**LATINE** Anser,

**ITALICE** Papas-  
ra, Ocho, Ocha.

**GALL.** Oye, Iars.

**GERM.** Gans.




**LATINE** Anas.

**ITALICE** Anatre, Anas-  
dre, Anitra.

**GALLICE** Canard, Cane.

**GERM.** Ent / Ent / Ant /  
Antvogel.




*Anas Indica mas.*

**ITALICE** Anatre d' India.

**GALLICE** Canard d' Inde.

**GERMAN.** Ein Indianischer Entsch.





Anas fera torquata maior, Boscas maior Athenæi, nam Boscas minor, uidetur Quera quedula, quam pag. 77. pictā dabimus. Periezomenen hanc Græcè dixeris, ut etiam sequentem: quanquam Bellonius ab utraq; diuersam, Anatem marinā à Gallis uulgò dictam, quæ cum coloris ruffi seu castaneæ sit, alba circa collum torque insigniatur: [sicuti etiam sequens.] sed rostrum quale pingit, cum uerbis in descriptione eius potius parum conuenit. Aliam marinam Anatem, pagina sequente dabimus.

GERMAN. Storzent/Storent/Grosse ente/Mergent. Alicubi, ni fallor, etiam Nuggent/Mosent/Mürent.




## Ordinis sept. Pars I.

75

*Anas fera torquata minor.* Lege quæ cum antecedente scripsimus.

ITALICE Circa lacum Verbanum Cefon, ni fallor, nam  
alibi cygnum sic appellant.

GERMAN. Ketschent/Blassent/Spiegelent/Wilde blaus  
went/Hagent



*Anas fera* quædam marina, quam inter platyrhynchos, id est latirostras, in opere nostro descripsimus. Huic cognata fortè est, quam Miseni Caudacutam cognominant, ein Spitzschwanz. longior enim acus-  
tiorq; eius cauda uidetur, quàm plerisq; huius generis. Aliam quidè  
marinam Anatem Rondeletius pingit.

GERMAN. Ein seenogel/Ein meerent.



*Anas fera fusca uel media, id est mediæ magnitudinis. Penelops ueterum uidetur : quanquam Bellonius hanc aut simillimam, Glauciū ueterum facit: quæ à Gallis Morillon dicatur, libro 3. De auibus, cap. 10. Deinde cap. 18. aliam ei similem esse dicit, capite ruffo, &c. quam Gallicè circunſ loquitur, Cane a la teste rouffe, Idem fortè Penelops ueterum est, ſimiliter puniceo uarioq; collo, &c.*

GERMAN. Wildegraweent/ Rothalf/ Nittelent.





**LA TINE** Querquedula, per onomatopœiam. Græcis Boscas minor aut Phasas, sicut etiam Bellonio uidetur, (qui tamen Latinum eius nomē nullum posuit,) lib. 3. De auibus, cap. 21. Descripta ab eodem Anas parua, capite or, eiusdem libri, rostro cæterisq; partibus anatinis, sed capite cirrato, oculis fuluo colore splendidis: capite, collo toto, & anteriori pectoris parte nigris; linea per alas candida trāsuerfa (unde à Gallis Cotee uocatur,) Querquedula cristata dici posse uidetur: uentre plumbei coloris. Colymbis quidem ea non est, ut ipse putat, cum rostro sit lato, quod Colymbidi Athenæus acutum tribuit. Quæ Anas Circia à Ge. Fabricio nominatur, Germanicè ein Vircilgen, à sono uocis: Querquedula fusca est. Quæ uerò circa Argentinam Kernell uocatur, à coloribus diuersis Querquedula uaria cognominetur.

**ITALICE** Cercedula, Cerceuolo, Scauolo, Garganello, Garganei, Sartella.

**GALLICE** Cercella, Cercerella, Sarcelle, Alebranda, Halebran, Garfote.

**GERMAN.** Kleine ent / Grawentle / Märentle / Sorentle / Trössel / Socke / Krichentlein / Krigente / Kruckentle.




Anas muscaria, ut nostri uulgò uocant. quanquam & torquatam maiorem alibi muscariam cognominari audio. Magnitudo ei & figura ferè quæ mansuetæ Anat. peculiare ei dentes utrinq; ferrati, latiusculi, & quodammodo membranacei, flexiles, Color plumarum per totum ferè corpus uarius est, ex nigricante, charopo, albo & mustelino alicubi mixtus: qualis Perdicum ferè, hoc est, *νεραυνοῦς*. Huic congener uidetur Anas strepera à Ge. Fabricio nominata, Misenis, *ein Zeiner*, à uocis strepitu grauiore.



Anatis platyrhynchi, id est latirostræ species, quam nostri Schellent appellant: uel à rostri figura. rostro enim genus crepitaculorum ex ære, quod schellas nuncupant, ferme refert. Vel potius quoniam inter uolandum alis suis ita perstrepit, & crepitaculorum huiusmodi sonum repræsentet. Figura hæc rostri latitudinem non satis exprimit.




Caput Clangulæ. Sic autē hanc anatem appellare uoluit Ge. Fabricius, nam & Miseni uocant ein Klinger/ab alarum clangore, quæ firmissimæ sunt, nec sine sono in uolatu mouentur, Mihi uel eadem, uel omnino congener superiori uidetur.






Caput Fuligulæ. Sic enim hæc quoq; G. Fabricius nominat, à fuligineo totius corporis colore: unde & Germanicum nomen ein Kùßgen.




Caput Latirostræ maioris, ut idē Fabricius appellat, quòd rostrū ei duplo ferè (inquit) quàm cæteris latius sit.

GERMAN. Ein breitschnabel.




Puphinus uulgò ab Anglis dictus, avis marina, cuius iconem & descriptionem Io. Caius medicus Anglus ad nos misit, anatis parvæ magnitudine. Vox illi naturalis, Pupin, est: à qua Pupinus melius diceretur. In piscis usu est apud Anglos, uel in solenni ieiunio: carne & gustu Phocæ haud dissimilis, gregalis, carne, si domi nutriatur, libentius quàm pisce uescitur, &c. Hanc prius adhuc incognitam, ficto Phocæ marinæ nomine in Paralipomenis Historiæ auium descripsimus.



GERMAN. Ein sundere gattung der Meerenten/ wirt in Engelland ein Puffin genant/ vnd ouch in der Fasten für fisch geassen: mag ein Fischvogel oder Fischent geheissen werden.

Anas quadrupes, cuius historiã dedimus in Volumine de Anibus pagina 117. in Capite de anatibus quas Ge. Fabricius apud Misenos nobis descripsit. Videtur autem à Puphino Anglorum pximè exhibitio nihil ferè differre, nisi numero pedum.

GERMAN. Ein ent mit vier füßsen/ sunst in allwäg dñlich der nächstgesetzten.



Ord sept. Pars I.

81

LATINE Cygnus, Cynus, Olor.

ITALICE Cino, Cigno, Cefano.

GALLICE Cyneuel Cygne.

GERMAN. Schwan/ Delb/ Elbs.



Anseres marini, quos Scoti **Clatis** appellant, quæ ex putrescentibus in mari lignis nasci creduntur. Recentiores quidam Brantas & Berniclas appellant, ut Albertus & alij. In nonnullis codicibus scribuntur etiam Barliatæ, Bernecæ & Barbates, corruptis (ut conijicio) uocabulis.



Capercalze, id est syluestres equi appellati vulgò à Scotis, solius pinus arboris extremis flagellis uictitant, Hæctor Boëthius. Aiunt has aues coruis paulo maiores esse, ac in delicijs haberi.





Gustarda avis uulgò apud Scotos dicta,  
ni fallor, à tarda uel bistarda, id est oti-  
de, longè diuersa.



Anser Bassanus uel Scoticus, avis  
marina.

SCOTICE uulgò à Solendguse.

GERMAN. dici potest So-  
lendganf/ oder Schottenganf.



*Corvus aquaticus* (aut *Graculus palmipes*) *Aristotelis* fortè, nisi is idem cum *Phalacrocorace* est. *Carbo aquarius* *Alberto*, & *Mergus magnus niger*. *Bellonius* *Phalacrocoracem* aliter pingit: rostro penitus recto, non unco parte extrema. *Aristoteles* *Corvum aquaticum* solum *palmipedum* in arboribus consistere & nidulari scribit. *Bellonius* præter *Phalacrocoracem*, etiam *Mergi* speciem (quam *Galli Fibrum* nomenclant) in genere *Palmipedum* id facere tradit. Facit hoc quidem & hic exhibitæ avis, ut hoc quoque nomine (sicut & magnitudine, coloreque) *Phalacrocoraci* cognata videatur: & *Anseris* genus ferum (ni fallor) quod arborum Germani cognominant, quanvis non unam speciem, sed alijs in locis aliam.

GERMAN. Scharb/Nezescharb.



F. Merganser, Mergus anseri magnitudine figurâq; similis. Cognatus omnino huic uidetur Mergus ille quem Bellonius describit uulgari Gallico nomine, Herle uel Harle, ad Ligerim fluiuii usitato. sed is Anseri fero minor est. Specie (inquit ipse) Anatem magis quam Anserem refert. Circa collum & in uentre pomi Nerantij colorem habet. Plumæ supra collum & capitis nigrae sunt. alæ prorsus albæ forent, nisi parces illæ quas diminutio no mine Galli allerons uocant nigricarent. Rostrum longum digitos tres, in hoc ab anasino differt, quia teres est, & mucrone reflexo, colore subrubro, ut etiam crura & pedes. Idem Morillono (id est, Anati ferae fuscae uel mediae nostræ, aut maxime simili) in eodem Capite coniungit aliam ueluti affinem, quam Gallicè uocat un Tiers, quod tertia mediâq; sit inter alias duas Anates, nempe cicurem & hyluestrem illam quam Morillonum uocant. ego inter Anatem & Mergum, mediam facerem. huius enim rostrum habet, illius autem corpus ferè, &c.

**ITALICE** circa lacum Verbanum, Garganèy: Bellonius tamen Querquedula nostram Mediolani sic uocari tradit.

**GERMAN.** Meererach/Weltsche ent: & in Acronio lacu Seesluder/ni fallor.





Anser arborum uulgò  
dictus Germanis circa  
Argentoratū, Baum-  
gans. Anser paulò  
minor est, & in salici-  
bus moratur infra su-  
praq̃ aquam.



F. Mergi longirostri minoris caput. Ipse mediocri anate paulò minor est, corpore nigro  
præter alas, in quibus pauca tantum penna candidæ & collum subrubrum, &c.

GERM. Langshnabel/ à rostri lon-  
gitudine: Schluchrente/ à gemitu uo-  
cis. Est & alius apud nos Mergus lon-  
giroster maior, cristatus & ipse, simili ro-  
stro, & ruffo capite: quem Bellonius quo-  
niam GALLICE Bieure dicitur, id est,  
Castor, Latine Fibrū nominat, quoniam  
(inquit) ut Fiber quadrupes maxima  
pernicie in pisces grassatur (Rondeletius Ca-  
storem corticibus ramisq̃ arborum & folijs, & fru-  
tibus potius nesci quam piscibus docet: ita hæc  
avis in stagnis & piscinis piscium uoracissima est. Idem hunc Mergorum maximum facit, magnitudine mediocri  
Anseris feri, nos precedenti pagina fisco Merganseris nomine, maiorem dedimus: hunc, Merganserem minorem co-  
gnominabimus. Eiusdem generis est quam Miseni uocant, ein Rogis, Ge. Fabricius Anatem raucedulam:  
cui iidem caput cristatum est, corpus & ala cinerea, &c. GERM. Hann / Ganner / Werg / Kleiner  
Weerrach: quem ueterum Hipparion esse coniicio.



Caput anatis seu Mergi quē uulgò Mife  
ni mustelarem appellant, Ein wisels  
gen: quod mustelā ruffo capitis colore  
referat. Cognatus hic est superiori.

GALL. Castagneux, ni fallor, à castas  
næ colore. Nostri eandem aut simil-  
limam & eiusdē omnino speciei auem


ysente/ hoc est anaticulam glaciale appellat. Ego hanc ipsam cum præcedente &  
sequente, mergi uarij uel glacialis nomine cōmuni appello. nō enim tam specie, quā  
cirrho capitis, coloribus & magnitudine differunt, omnium quidem corpus albo &  
nigro colore distinguitur. Bernella tantum uulgò Germanis dicta in hoc genere nō  
similiter ut cæteri his coloribus pingitur.



Mergus uarius maior, uulgò Mergus Rheni, & Monialis alba à colorum uarietate. Bellonius hanc ueterum Phalaridem esse suspicatur. mihi nō uidetur. Constat quidem ex ueteribus Phalaridem palmipedem esse, circa lacus & amnes degere: & sparsis ad stagnorum fluminūue margines frugibus, illaqueari. rostrum habere angustum, caput rotundius, uentrem & dorsum cinerei coloris. Cremonensis Kiranidæ interpres, Phalaridem interpretatur auem que uulgò dicatur Alba frons, tota nigra, fronte tantum alba, ea quidem ab Italis Folega quasi Fulica dicitur.

GALLICE Piette, quòd albo nigroq̃ Pica instar distinguatur ut plurimum.

GERMAN. Rhynent/Wurm. Aliqui hanc quoq̃, ut superiorem, Anatem glaciā lem nominant, yfente. Eiul dē generis est mergus qui albus cognominatur uulgò, *Ein wyffe tuchent* / magnitudine paulò inferior, caput cololumq̃ extra candidius habet, ac dorsum totum nigrū. Idem Italis non procul Alpibus appellatur Morgon, Gyuen, Pono, Garganello. Sed postremum hoc nomen etiam alijs anatis seu mergis tribuitur.



*Colymbus maior*. *Vria* uel *Vrinatrix maior*. (Bellonius quoq. *Vriam* nominat, *Svelay*, ex Athenæo.) *Pygoscelis maior*. Species huius generis tres aut quatuor sunt, quidam cristas habent, quos mergos cornutos ex Seuero Sulpitio appellare licebit (quanquam & de mergis uarijs & longirostris supra dictis aliqui cirrbati cornutiue sunt:) alij non habent. Magnitudine etiam differunt: & colore, & punctis. est enim genus unum, prona parte nigricans, candidis punctis uarium; membranis pedum integris, non dissectis ut in reliquis huius generis. pondere sex librarum ferè. Reliqua specie, præcipuè rostri & pedum, conueniunt. in lacubus degunt.

ITALICE Sperga, lurâr.

SABAVDICE Loere, ni fallor.

GALLICE Grand Plongeon deriuere.

GERMAN. Dûchel / & Fluder / ni fallor, in Acronio lacu. Hollandis Arsfœ voet / quod nos scriberemus Arsfûp.





# Ordinis sept. Pars I.


89

Colymbus minor, Colymbis, Vria uel Vrinatrix minor, Pygoscelis minor. Mergulus. Bellonio Mergus minimus fluuiatilis: quam in mari etiam cum uiuere scribit.

ITALICE Trapazorola, Arzauola; & circa Lacum Verbanum Piombin, id est Plumbina, quod nomen alij ispidæ aut melius, ut puto, attribuunt.

GALLICE Petit Plongeon, Castagneux, Zoucet,

GERMAN. Dückelin/ Hürchelin/ Duchentlin/ Käche/ Kägsgele/ Tüchterlin/ Psürzi/ Käferentle/ Arpfuß der klein/ Mergigeln quasi Mergulus.



Eiusdem generis alterum, aliquanto maius & nigris. Mergulus niger.

GERMAN. Ein anders Dückele/ Schwarz dückele.



Rallus hæc anis circa Venetias appellatur, palmipes, aquatica, & in delicijs habitata. Ortygometa fortè Bellonij. Refert ferè fulicam nostrā corporis specie; sed in alis & circa oculos plus albi coloris habet, rostrum nigrum, crura subviridia, membranas inter digitos non ita dissectas, caluitium nullum, quantum ex pictura assequor.

GERMAN. *Ein Welsch wasserhân.*



**LATINE** Fulica, Pullus aquæ Alberto. Phalaris Kiranidæ. De Phalaride plura leges superius in Mergo uario, pagina 87. Quærendum an hic sit *Kodios*, id est, Graculus palmipes ille Aristotelis, quem circa Lydiam & Phrygiâ reperiri scribit, (nimirum quia in illis regionibus plures & maiores sint lacus,) potius quàm Phalacrocorax Plinij, quæ Aristoteles alio in loco Coruum (aquaticum) nominare uidetur, & Ciconiæ magnitudinē ei tribuit, sed crura breuiora: Graculis quidē ad summum Cornicis magnitudo tribui potest, quæ huic potius aui quàm Phalacrocoraci conuenit.

**ITALICE** Folega, (sed audio Italos duplicē facere folegam. minorē, cuius hæc icon est: & maiorē, quā phalacrocoracē esse coniicio, & eundē apud Holādos dici *Meer-coot* uel *Marcol*. nec displicuerit si quis etiā fulicā nostrā, phalacrocoracem minorē appellet.) Polun, Pullon, alibi ei nomē à fronte alba, ut Kiranidæ interpres scribit.

**GALLICE** Pulle d'eau, Foulque, Foucque, Foulcre, Diable Parisijs ab atro colore, lodelle, loudarde, Belleque. Bellonius Gallus fulicam Italis dictam, gallinam aquaticā esse ait. **GERM.** Belch/Böllhinen/Belchinen/Flom/Pfass/Bles/Blessing/Wasserhün/Korheile/Zapp. Sunt qui Fulicā ueterum non hanc auem, sed Aristotelis Cepphum esse existiment, quemadmodū etiā Gaza transtulit, præsertim cum mari nas fulicas Vergilius dicat, nostra uero palustris seu lacustris tantū sit. Quæ apud Misenos *Wasserhün*, id est gallina aquatica, nominatur, fulicæ nostræ per omnia similis est, nisi quod caluiciū in fronte (seu maculam glabrā & albam) non habet, infra oculos uerò utrinque alba macula in plumis rotunda apparet, si recte pictura repræsentat.



Pelecānus, ut uulgo à pictoribus effingitur,





**LA TINE** Pelecanus, Platea uel Platalea, auis ad viuum expressa.  
 Bellonius Pelecanum uel Plateam auem, eandem Onocrotalo facit,  
 (quod non laudamus : ) hic uerò depictam, Ardeolam candidam,  
 uel Albardeolam nominat. Nos Ardeam albam, à cæteris Ardeis  
 rostro non differentem, exhibebimus infra.

**ITALICE** Becquaroueglia.

**GALLICE** Pale, Truble, Poche, Cueillier.

**GERMAN.** Löffler/Löffelganß/Lesler/Lepler.



F. Recuruirostra uocari poterit hæc auis, donec aliud aptius nomen inueniatur. Sola enim rostrum neq̃ rectum habet, neq̃ deorsum flectit, sed sursum.

ITALICE Auofetta, Beccostorta, Beccoroëlla, Spinzago d' aqua.

GERMAN. Ein frembder wasservogel / wirdt selten by vns gesehen / aber offft in Italia: mag genennt werden ein Oberschnabel / darumb daß er den schnabel uersich bückt.



**LAT.** Onocrotalus Græcis & Latinis, Truo apud Festum. Bellonius hanc auem eandem Pelecano uel Plateæ (aut Plateæ) facit: quod nos non probamus.

**ITAL.** Grotto, Agrotto, Grotto molinaro, Grotto marino, Ocello d'el ducha.

**SABAVD.** circa lacum Lemannum Gouttreuse, id est, Gutturosa. **GALLI** quidam, præsertim Brabant, Libane uel Libane uocant.

**GERM.** Onnogel/Meersgans. Quidā interpretatur Schneegans/nescio quā recte: nam nostri tantū anseri fero cuidam paruo id nomē tribuūt. Possent etiam fingi nomina, Kropfselb / Eselschreyer/ Kropfgaß/ Sackgans.



Onocrotali caput à pictore quodam olim nobis communicatum.

**GERMAN.** Des Onnogels kopff.



Eiusdem figura ex tabula Septentrionali Olai Magni, in qua quid malè expressum sit præcedentium collatione intelligi potest. . .

**GERMAN.** Ein Onnogel / wie in etlich malend / aber nit recht.





## ORDINIS SEPTIMI PARS II. DE PALMIPEDIBVS

quæ circa aquas uolitant, & piscibus magna ex parte uiuunt. Ex his quatuor priores  
laros uel gauías generali nomine appello: qui omnes circa dulces aquas  
degunt, marítimi enim adhuc nullius iconem habere potui.

**L A T I N E** Larus cinereus Aristoteli, Gauia cinerea, ut Bellonius etiã appellat.  
Larus tum cinereus tum albus (inquit ille) à mari ad loca mediterranea, dum am-  
nes & lacus sequuntur, satis altè ascendunt. Albi species duæ sunt: Vna, maior,  
candida instar niuis, nisi quòd parum cinerei in alis habet: rostro & pedibus rubris.  
Altera minor, capite nigro.

**I T A L I C E** Galedor, Galetra, Gauina.

**G A L L.** Gauian, Mouette cendree, Glaumet, Maulue. **S A B A V D I S** Grebe uel  
Griaibe, Beque, Heyron. sed hoc postremum nomen ardeæ potius debetur.

**G E R M A N.** Neb/New/Mief/Allenbock/Holbroet/Holbräder.



Larus minor, Sterna uel Stirna ut Britāni & Frisij nomināt, A marinis sola magnitudine & colore differt. Rostro & cruribus rubet: capite nigro, collo & pectore albo: dorso & alis cinereis.

GERMAN. Stirn / Spyter / Schniering.

Larus quem piscatorem cognominō, imitatione Germanici uocabuli circa Argentinam usitati, Caput nigrum est, rostrum pallidum: collū anterius & pectus albert: dorsum cum alis cinereum est.

GERMAN. Fischerlin / Sel.



## Ordinis sept. Pars II.

97

**Larus niger**, pleræq; enim eius partes nigræ sunt, (rostrum, caput, collum, pectus, &c.) alæ tantum cinereæ, crura leui rubore notantur. Albertus Fulicæ & Mergi nigri appellatione non Fulicam nostram, sed Larum nigrum intelligere uidetur.

**GERMAN.** *Meynögelin/Schwarzer mewb: & Brandvogel*/ni fallor, circa Gandauum.



## ORDINIS VII. PARS III. DE AVIBVS NONNVLLIS quæ circa aquas uolitare solent quanquam non palmipedes.

**LAT.** *Hirundo sylvestris* uel *riparia*, *Ripariola*, *Drepanis*: ut à Bellonio etiã nominatur, qui tamen iconem nō exhibuit.

**GAL.** dici potest *Hirondelle de riuage*.

**GERM.** *Kynnögele / Kynschwalme / Wasserschwalme / Feelschwalim / überschwalbe*: nōnusquam *Spyr*/sed nostri apodem sic uocant.



**LATINE** *Merops*, *Apiaſter*, *Flōrus*, (sed alia est *Anthus* Aristotelis quam *Gaza* Flōrum reddit.) Iconem hāc Bellonius nobis exhibuit, eiusdem (ut conſicio) uel parum diuerſæ auis ab illa quam ſubijciemus ſtatim.

**ITALICE** *Dardo*, *Gaulo*, *leuolo*, *Lupo de Papi* (Italus quidam hoc nomine in Italia auem, roſtro ſtudioſe mihi retulit: Bellonius ſuo nigrum tribuit) *Picciferro*: alibi etiam *Grallo*, ut *Niphus* ſcribit: qui tamen alibi *Galgulum* quoq; *grallum* interpretatur.

**GALLICE** dici poſſet *Gueſpier*, ab eo quòd apiculis & ueſpis ueſcatur, Bellonius, **GERMANICVM** nomen fingere licebit, *Imbenwolff/Imbenſtraß*.

*Lege quæ cum ſequenti mox iconi annoramus.*





**F.** Merops alius, uel cognata auiis. Hirundo marina, ut quidam Germanice nominant. Ispide nostrae, quae paulò post sequetur, cognata est auiis. Merops (inquit Bellonius) Italici rarus, Gallis nullus, apiculis et in spis uescitur, quas sequitur ad latera montium uolitando gregatim, sicut et Graeci hodie nuleò in Creta, ubi frequens est, Melisophago dicitur, Latine Apis-ster. Magnitudine est Merule, in cibum non uenit, ut nec Ispida à quibusdam dicta auiis, cui persimilis est, et similiter terram excauat: plumis et coloribus tam eleganter uestitus quam Psittacus: pedibus etiam similiter digitatis, ita ut digiti bini retrorsum, et totidem antrosum tendant. Lingua ei longa et gracilis est. Rostrum nigrum, oblongum, et falcis instar inflexum, quasiq; triangulū. cauda prorsus cerulea, ultra alas extensa. Crura breuia, ut agere super terra consiliat, ut plurimum uolans. Pars sub rostro et pectore pulchre flaua est: et uirga; linea nigra distinguitur. Magnitudo ei quae Merule, quanta fere hic pingitur. Hec certe descriptio, eam ipsam auiem, quam nos hic pinximus, esse arguit. digiti quidem pedum in ipsius etiam pictura similiter ut hic collocati sunt. Vox Meropi (inquit idem Bellonius) clara, et tam alta ut Orioli, similis fore sibilo hominis, qui ore in rotundum aperto (lingua ad palatium reflexa) edatur, ac si cantillaret Grugurururul. Ab ea fortè Meropis nomen Graeci ei fecerunt.

**GERMAN.** Seeschwalim/circa Argentinam, quanquam rarissimè illic conspicitur.



Capra uel Capella (*Alf*) Aristotelis, ut Bellonius coniicit, quòd uocem instar Capræ addere uideatur, eam ipsam scilicet qua nominatur Aex, Aex. Sunt qui Parcum Plinij esse putent. Plinius semel tantū non Parci, ut quidā legunt, sed Parrae meminit, cornicula ei tribuens. Albertus & alij Vanellum nominant.

**ITALICE** Pauonzino, Paon, Paoncello, Paonchello: id est, Pauo, uel Pauunculus: sicut & à Græcis hodie Taos agrios, id est, Pauo syluestris. nam & cristata hæc auis est, ut Pauo: & collum, quā capiti iungitur, similiter gracile habet; & plumarum colores similiter uario pro diuerso ad lucem positu splendore ostendit.

**GALLICE** Vanneau, Papechieu; uel per onomatopoeiam Dixhuit.

**GERMAN.** Gysiz/Gynitz/Gybyz/Kynüz/Zweiel.



Spida apud recentiores, Italis Plumbina, quod plumbi et perpendiculari instar recta deorsum, dum piscibus inhiat, feratur. Galli quidam Angli, et Itatorum etiam multi piscatorem appellant, uel simpliciter, uel Martinum piscatorem, uel regium. Sunt qui Alcyonem fluuiatilem appellandam censent: cuius ego olim sententiae auctor fui, sed nibildum affirmo. Bellonius Alcyonem duplicem facit: unam, Spidam nostram: quam apionon, tanquam ex Aristotele, id est, mutam, (non simpliciter, sed comparatione alterius,) uel maiorem cognominat: (cuius et species et natura ferè ad Meropem accedit, ut in Merope diximus: pedibus etiam similiter breuibus, quare in terra non insistit.) Alteram uerò minorem et uocalem nominat, quae in locis palustribus omnium suauissimè cantillet: unde à quibusdam Rosignol de riuere appelletur, id est, Luscinia fluuiorum: quoniam et suauissimo cantu, eoque dies ac noctes perpetuò, audientes oblectet. Scandit per arundines ita ut Picus per arbores. quantum digitos pedum non ut Picus, sed ut Merula et pleræq; aues habeat. Colore et cauda tyngen refert, magnitudine autem Procyterum à Gallis dictam, (Millarium Latine uocat Bellonius, et Alauda cristata maiorem facit.) Rostrum ei quodammodo ad Picæ Græcæ (id est, Lanij nostri) rostrum accedit. Videtur esse cristata, quoniam capitis eius plume longiuscule sunt. Crura et pedes mediocri longitudine, colore cinereo. Hanc, inquit, Galli uocant Rousserole, nimirum à colore ruffo uel infumato: diij Rousserole, quoniam interdum in carectis degat: ubi etiam nidificat ex paruis arundinum stipulis. Oua ut plurimum quinq; aut sex parit. Hyeme non recedit. Hec Bellonius. mihi quidem inter duas has aues cognatio nulla esse uidetur: et neutrius historia congruere cum Alcyone ueterum, multò minus autem posterioris.

**TALICE** Plumbino, Vcello del paradiſo, Pefcatore, Pefcatore del re, Martino pefcatore, Vcello di ſanta Maria, Vitriolo à colore chalcantbi.

**GALLICE** Pefcheur, Martinet pefcheur, Tartarin per onomatopœiā. Artre quòd tinea abigere credatur eius sceletos. Moua nier, ni fallor, circa Lutetiam: et à nonnullis improprie etiam Piuera, id est picus: cuiſi Aquatilis differentiam addas, non erit ineptum nomen.

**GERMAN.** xſuogel/Ẽiſuogel/xſengart.

*Digitis pedum, neq; in nostra, nec in Bellonij piſtura (quamquam uerbis ipſe probè deſcripſerit) probè expreſſi ſunt. habet enim illoꝝ peculiari quodam modo, ut nulla alia auiſ, &c.*



## ORDO OCTAVVS DE AVIBVS AQUATICIS

illis quæ non in aquis, sed circa aquas degere solent, & circuire potius quàm circumuolare, sunt aut fidipedes omnes, non palmipedes, & pleræq; cruribus longiusculis, Et postremò de motacillis quibusdam.

IN HOC ORDINE PRIMVM ILLAS PONAM, QVAS GENERALI uocabulo Gallinagines uel Gallinulas aquaticas appello, uel Trochilos aquaticos. **ITAL.** Giarioli, Girardelli, **GERM.** Wasserhänle. Germanica quidem nomina singulis adiecta, circa Argentinam in usu sunt.

**ARISTOTELES** Historie 8.12. ubi Ortygometram scribit *ορτυγανόριον είναι τὸν ποταμὸν τοῖς λιμναίοις*: hoc est, specie similè palustribus auibus: (et in Physiognomoniciis, *τοὺς ὄρνιθας* (malim ὄρνιδας) *ἢ λιμναίων συνόνομασται*: hoc est, Aues palustres, pedibus angustis esse, digitis nimirum angustè coniunctis, et naturæ timide, unde homines etiam timidi esse conijciantur illi, quibus digitis pedum similiter *συνεφεγγαῖνοι* fuerint:) de hoc genere auium proculdubio sentit. Gallicè *Ragles* omnes hæ aues dici posse uidentur, (et Italicè fortè *Ralli*.) differentia aliqua adiecta, Bellonius. Bellonius duas tantum huius formæ aues describit et pingit: nempe *Rallum* nigrum Gallicè dictum, quem Ortygometram facit: et *Rallum* rubrum uel à genitilis cognominatum: quam *Perdicem* rusticam seu rusticulam esse conijcit.



# Ordo octauus.

101

F. Gallinula Serica dici hæc auis poterit, quod color ater in ea holoserici instar splendeat. Quærendum an hæc sit Ortyz gometra Bellonij.

GERmanicū etiā nomen similiter finxerim Samethünle.

F. Erythropus maior, à rubro colore crurū. An hæc sit Erythropus cuius Aristophanes meminuit, dubito. Minoris iconem requires inferius.

GERMAN. Kotbein.



J iij

## Auium

F. Phæopus, à pedibus fuscis.

GERMAN. Brachvogel. alia etiam auis  
maior Brachvogel uocatur, quam nos Ar-  
quatam maiorem uocauimus.



# Ordo octauus.

103

F. Phæopus alter, Arquata minor.

ITALICE Tarangolo.

GERMAN. Râgenuogel. sed  
Arquatam maiorem quoque (ni  
fallor) nō defunt qui eodem no-  
mine appellent.

F. Ochropus magnus, cruribus pal-  
lidis. Mediꝝ minorisqꝫ icones se-  
quentur inferius.

GERMAN. Schmirring.





## Auium


F. Poliopus, à cruribus incanis.

GERMAN. Deffyt.



F. Glottis, fortè Aristotelis Glottidi congener. quam Gaza Lingulacam interpretatur. Ea linguam exerit prælongam, & ducem se præbet abeuntibus Coronicibus, sicut & Ortygometra, &c. non plus tamen uno die pergit, &c. Blaphis Oppiani pennas in dorso ceruinæ pelli colore similes habet: & lingua longissima in aquam protensa, sensim ad fauces deceptum aliquem piscem attrahit: Ardeolarum generis potius quàm Galinularum fuerit. hæ enim (opinor) piscibus non uescuntur.

GERMAN. Glutt.




F. Rhodopus, à roseo colore crurum.

GERMAN. Steingällyl.

F. Hypoleucos, à colore partium supinarū  
(collis, pectoris, uentris,) qui purè candidus  
& absq̃ maculis est: reliquū corpus fuscū:  
crura quoq̃ fusca cū modico colore ruffo.  
Rostrum nigrum, modicè flexū anterius,

GERMAN. Systelin.





# Ordooctauus.

107

F. Melampus, cruribus nigris.

GERMAN. Kottmillis.

F. Ochropus medius, cruribus pallidis, Minoris icon sequetur, magni præcessit,

GERMAN. Mattmillis.



F. Erythra, à colore rubro. Totū enim ferè corpus ei rubicundum est, Venter quidem albicat, sed rubro colore suffunditur. crura leucophæa sunt, Obscurior hic rubor in dorso est, & maculis nigris interceptus: clarior in alarum alis quot pennis: in quibus longissimæ ad rubricæ fabrilis colorem accedunt. Rostrū nigricat non absq̃ rubore, brevius q̃ plerisq̃ in hoc genere.

GERMAN. *Mattkern*. Audio ab alijs etiam *Xynvogel*/hoc est auem Rheni appellari paruum quādam in gallinularū genere, colore uariā, subfuscā, & alio nomine *Mattkern* dici.



F. Ochra, à totius ferè corporis colore subuiridi, sed fordido & obscuro: prona parte magis fusco. Caput, collum, pectus & alæ, punctis & maculis cādidis insigniuntur. cauda aliqua ex parte albicat, Rostrum partim nigricat, partim puniceum est. Crura, ut in Ochropodum genere, lutea.

GERMAN. *Wynternell*.



F. Erythropus minor, Maioris iconem superius habes.

GERMANICE Koppriegerle.

F. Ochropus minor, cruribus pallidis, Magni & medij icones præcedunt.

GERMANICE Kiegerle.






**LATINE** Rusticula uel Perdix rustica maior. Aristoteli Ascolopas: uel ut alibi melius legitur, Scolopax, ut Herodianus etiā habet, Gallinago, ut Gaza transfert. Auicæca Gallis quibusdam hodie ficto nomine, quoniam panthero retis genere tam facile capiatur, ut aliqui auem cæcam esse existimarint. **GRÆCIS** hodie Xylorintha. Alia est Gallina rustica, ut Bellonius docet, quā nostri à corylis denominant: quæ tamen Perdicum potius generi, quàm Gallinarum cognata uidetur, & syluatica quædam aut montana Perdix esse.

**ITALICE** Gallina arcera, Arcia, Pola, Gallinaza, Gallinella, Beccassa.

**GALLICE** Becasse (alijs c. geminant, Beccasse,) ac si rostricem Latine dicas, Becasse grande, Bequasse: alijs Videcocq, uel Vitcoc, ab Anglico nomine **Wodcoc**, quod Gallum syluestrem sonat.

**GERMAN.** Schnepf/Schnepshân/Xietschnepf/Grosser Schnepf. Flandris **Sneppe**. Brabantis **Neppe**.



*Versus Nemesiani.*

Cum nemus omne suo uiridi spoliatur honore,  
Fultus equi niueis syluas pete protinus altas  
Exuuijs. præda est facilis & amœna scolopax.  
Corpore non Paphijs auibus maiore uidebis,  
Illa sub aggeribus primis, qua proluit humor,  
Pascitur, exiguos sectans obsonia uermes.  
• At non illa oculis, quibus est obtusior, et si  
Sint nimium grandes, sed acutis naribus instat,  
Impresso in terram rostri mucrone sequaces  
Vermiculos trahit, & uili dat præmia gulæ.

*Martialis distichon, sub lemmate Rusticula.*  
Rustica sum perdix. Quid refert, si sapor idem est:  
Carior est perdix, sic sapit illa magis,

## Ordo octauus.

III

Alia est quæ simpliciter Rusticula dicitur, uel Rusticula palustris maior, cuius icon præcedit: alia uerò Rusticula syluatica, cuius hæc figura est, syluatica potius quàm palustris: unde & à Germanis uocatur *Waldschnepf* / *Holzschnepf*: maior superiore, cum Gallinam ferè æquet: & colore simili quidem, sed saturatiore, cruribus cinereis, uentre albicante, rostro minus longo, ut pictura ostendit, quam ab Argentoratensi aucupe eodemq; pictore accepi.



• •  
K ij

**LATINE** Gallinago uel Scolopax minor, siue Rusticula minor. Bello-  
nius Ascolopacion etiam appellat, ficto nomine diminutiuo ab Ascolopace.

**ITALICE** Piczardella.

**GALLICE** Becasson, Becasse petite, Becassine, Becasseau. Vocantur &  
aliæ duæ auium aquaticarum species à Gallis eodem nomine Becassine. qua-  
rum prior ea uidetur esse, quæ à nobis *Samethinle* nominata est supra pa-  
gina 101. ipse Cinculum Aristotelis esse suspicatur, posterior Gallicis tantum  
nominibus ab eo uocatur Becassine la plus petite, id est, Gallinago minima:  
et Deux pour un, quod cum dimidio minor sit Gallinagine maiore, duæ  
huius generis precio unius maioris uæneant: & obseceniùs Fouton, nomine  
Oceani accolis usitato, quoniã caudã præ cæteris ferè auibis subinde agitet:  
unde Cinculum minorem appellare licebit: & Germanico nomine ein Halb-  
schneepflin. Vtraq; à Bellonio describitur, sed non pingitur. Lege etiam  
infra in fine paginæ 123, in Motacillæ genere, &c.

**GERM.** Herrschneepf/ Hârsneff/ Harschnepf/ Grafschneepf/ Schneepflin.





Numenius ueterum, uel ei cognatus, Arquata maior, ut nos uocamus. Bellonius Eloquentium Aristotelis esse coniicit: & aliam quoque eius speciem paulò minorem inueniri ait, quæ Gallicè petit Corlieu uel Barge uocetur, (& ab aliquibus ab hac maiore non discernatur: uidetur autem ea esse, cuius icon proximè sequitur, rostro nō arcuato, sed recto, &c.

**ITALICE** Arcafe, Torquato, Charlot, Tarlino uel Terlino, Spinzago; uel, ut Bellonius habet, Caroli, Insulribus.

**GALLICE** Corlis, uel Corlieu per onomatopœiam.

**GERM.** Brachnugel/ Kâgennugel/ (nos suprà Arquatam minorem etiâ hîsdem nominibus appellari diximus.) Wetternugel/ Windnugel/ Grây. Frisîs Schrye. Frisîs Orientalibus ein Wallop. Hollandis Hamfens. Anglis a Curlew uel a Whaupe.



Gallinulæ maritimæ genus, quod Venetijs uulgo Limosam uocant. Limosa & Tostanus Venetijs dictæ aues, ut lac, Dalechampius medicus rerū naturæ peritissimus ad me scripsit, non sunt Ardeolarum generis, (pisces enim minimè captant;) sed Gallinulis aquaticis potiùs adnumerandæ. Bellonius pro Calidri scite depinxit. Galli Equites (Cheualiers) uocant, ob crurum longitudinem: earumq; colore distinguunt alteram ab altera, eam cuius pedes rubent & crura, uocantes Cheualier aux piedz rouges: alteram cuius è uiridi pallent, Cheualier aux piedz uerds, Sic ille. Colorem quidem rostri & crurum in Calidri suo rubere ait Bellonius: & in altera eius specie utrobique nigrum esse. At in nostris, non idem est rostri qui crurum color, &c. Sed cum reliqua ferè congruant, color non poterit genus diuersum facere, cuius species etiam una uidetur quæ Barge Gallicè à Bellonio uocatur, Latine Aegocephalus: quam imperiti quidam, ut proximè retrò monuimus, cum Ardeata confundunt.

ITALICE Limosa Venetijs, Girardel ad lacum Verbanum, Leuersina circa Neapolim.

GALL. Cheualier. Vide in Latinis nominibus.

GERM. Ein meerhân.



## Ordo octauus.

115

Gallinulæ maritimæ genus aliud, Venetis Totanus, Vide quæ cum præcedenti adnotauimus.

**ITALICE** Totano Venetijs, alibi Charlot: quod nomen potius ad Arquatam proximè dictam referendum est.

**GALLICE** Cheualier aux piedz rouges.

**GERMANICE** Ein ander meerhûn.



Æ iiij



Falcata Latine dici potest à rostri figura, ibidi cognata uidetur, Italis circa Ferrariam Falcinellus uulgò dicitur, ab alijs Ardea nigra, sed improprie, nã ardearũ generi illæ tantũ aues collo & cruribus proceris adnumerandæ uidentur, quibus rostrum est longiusculũ & directũ. Color etiam huic aui niger nõ est, sed uiridis ferè, pro diuerso ad lucẽ positu uarians, ut in Vannello.

ITALICE Falcinello, Ayron negro.

GERMAN. Ein Weltscher vogel/ wirt oft vñ Ferrar gefangen/ mag geneit werden Ein Sichler oð Sägiser/ vò der gestalt sines schnabels.



# Ordo octauus.

117

**LATINE** Ardea uel Ardeola pulla uel cinerea, Aristoteli pella,

**ITALICE** Airon, Anghiron, Garza,

**GALLICE** Heron gris ou cendre, Sabaudis Airon uel Heyron.

**GERM.** Keiger/Keigel/Ein graunwer oder blauwer (äschfarber) reigel/  
Reiher/Rayer/Heergansf. Friſijs Rarg. Flandris Riegher.



**L A T.** Ardea cirrhata uel cristata maior. Genus hoc ardeæ magnū est, capite & collo candidis, dorso & alis cinereis: sed maiores alarū pennæ nigricant, &c.

**GERM.** Ein reigel art/mag genannt werden Ein strußreigel.

Alia Ardeæ species cirrhato serè similiter capite, pingitur à Bellonio: qui illam Gruë Balearicam esse suspicatur, & Gallicè uocat Bihoreau: uel Roupeau, à rupibus in quibus nidificat ad Oceanum Gallicum. Quærendum an hæc sit Quaiotto Italo- rum: de quo lege mox pag. 119.



**LATINE** Ardea albā, Albardeola. **ITAL.** Airon bianco, Garza biancha: alicubi Agroto, ut Bellonius putat, sed hoc nomen Onocrotalo nostro debetur, quem Itali corrupto scilicet antiquo nomine Onocrotali sic uocitant.

**GALLICE** Heron blanc, Aigrette à uoce clara & magis sonora quā Ardeæ.

**GERMANICE** Wyßer reigel.

IN Italia Ardeam albam duplicem obseruauī, unam fuscā seu cinerea maiorem, Itali Girono uocitant: alteram minorem, quæ ipsam Garzetto uel Garietto, uel Gorgea nominatur. hæc etiam cirrho seu cristæ uerticis aliquando insignis reperitur. Bellonius Pelecanum nostrum, uel Plateam, quā dedimus supra pag. 92. Ardeolam candidam facit, quoniam Aristot. libro 8 cap. 3. rostrum latum porrectumq; ei tribuit: eam uero quā hic exhibemus Ardearum quoq; generi adnuerans, eam esse suspicatur, quā Garza Albicula nominauerit ex Aristotele, alio nimirum usus codice quā Aldus & alij quidam, in quibus Græce nullū nomen Albiculae respondet. Ego Ardeæ albæ nomen commune fecerim ad species tres, quarū una alio nomine Platea uel Pelecanus dicitur: altera quæ pulle uel cinereæ equalis aut etiā maior est, generis tantum nomine uocetur, Ardea albā: de qua scribit Bellonius lib. 3. cap. 3. Historie auium, nec pingit: quod solo colore, ut inquit, à pulle differat: tertia minor, quā hic exhibemus, quæ recte Ardeola albā uocabatur: quāuis ueteres nō ita exacte distinxerint.





**LATINE** Ardea stellaris maior. Hoc genus compositum uidetur ex ardea fusca & stellari minore, quæ propriè ueterū stellaris uidetur. Elaphis Oppiani fortè, aut cognata. Vide quæ scripsimus supra inter Gallinulas aquaticas, pagina 105.

**ITALICE** Ruffey, circa lacum Verbanum, fortè à colore ruffo colli & uentris,

**GERMANICE.** Großer roueigel.

Cognata huic & similis est ardea Quaiotto dicta circa Adriaticum mare, iride oculorū similiter flaua: quæ cum ad ætatem peruenit cirrhos à capite retro oblongos tendit, albos, in extremitate nigros, &c. Vide caput Ardeę cirrhatum superius pagina 117.



**LA TINE** Ardea stellaris Plinio & Aristoteli, quòd punctis tanquam stellis eleganter picta distinctaq; sit. Vocatur & Ocnus. Bellonius eandem Taurum à Plinio dictam esse coniicit. Butorius uel Botaurus (quasi Bos taurus) recentioribus à murgitu quem aedit rostro in terram palustrem inserto, uel inter harundines.

**ITAL.** Trumbono, Tarabuffo, Terrabusa, Aigeron. **GALL.** Boutor. Armoricis Galerand. **GERM.** Wünd/Meerrind/Moskū/Mosochs/Kortrui/Kordump/Kordumpf/Korduniel/Koreigel/Mosfreigel/Lorind/Wasser ochs/Mor/Dompshorn/Erdbüß/Hortybel/Pickart/Fauser. Frijs Keidom mel/Kosdam. Sunt qui Gallico nomine corrupto Pittouer appellant.



## Ordo octauus.

121

**LATINE** Ciconia, Ibis alba Herodoto, ut Bellonius sus-  
spicatur. Vide supra Ordine III, in Ibiside.

**ITALICE** Cigogna, Zigognia.

**GALLICE** Cigogne.

**GERMANICE** Storck/ Storch. Saxonibus Ebeher.  
Rostochij & alibi Adebarg uel Odeboer. Flandris Honare.





*Ciconia nigra*, cuius ueterum nemo meminit præter Albertum Magnum, Genus *ciconiæ* (inquit) dorso omnino nigrum (si minus uideas: sin propius, in nigro subuiride apparebit, cum cæruleo & pauco purpureo mixtum, ut in Coruo syluatico & Vanello ferè,) uentre subalbum: quod non in locis habitatis ab hominibus, sed in paludibus deserti nidificat. Reperitur multis Heluetiæ locis desertis & montanis.

GERMANICE Schwarzer storch.



LAT. Cincus, ut Turnero placet. Auicula (inquit) quam ego cincū esse puto, galerita paulo maior est, colore in tergo nigro, uentre albo, tibijs longis, & rostro neutiquam breui. Vère circa ripas fluminum ualde clamorosa est & querula, breues & crebros facit uolatus. Aliā auē Cincum esse suspicatur Bellonius, de qua scripsimus supra in Gallinagine minore pag. 112.



GERM. *Lyflicker*/circa Argentinam, alibi *Steinbicker*/ & *Steinbeyffer*. Nostrates hoc postremo nomine *Coccothrausten* nostrum appellant.

F. Mer.

F. Merula aquatica uel riuialis.


ITALICE Folor uel Folun d' aqua, Lerlichirollo, circa lacum Verbanum.

GERMAN. Wasseramsel / Bacchamsel. Cæterum Eberus & Peucerus in Saxonia etiam palmipedem auem minimam in mergorum genere, quam Vrinatricem ueterum esse putant, Germanicè nominant Wasseramsel / & Schwarztücherlin / id est merulam aquaticam, & mergulum nigrum. Georgius Agricola merulam interpretatur Amffel & Sehamffel / marinam quoq; uel maritimam quamdam merulam esse aut dici insinuans.



Motacillæ genus, fortè Tryngas Aristotelis, aut Schoenicius, id est iūco, ut Gaza uertit.

GERM. in Misnia Pilwencigen / uel Pilwegichen / nomine composito à sono uocis, et ab agitatōe caudæ, uel Pilente / à quadā similitudine cū anate. quantq; palmipes nō est, & rostrū longū, (molle et colore cinereū) ac alta crura habet. Eius duo genera sunt, maius & minus. Minus est cuius picturam damus, magnitudine merulæ, tergum ei cinereum, uenter albus, alæ & cauda superiore parte cinereæ, inferiore cum albo distinctę.



Quærendū an aliqua Galinaginis minoris aquaticæ species Bellonij, (de quibus suprà scripsimus pag. 112.) cū harum alterutro genere conueniat.

Motacilla quam nostri albam cognominant. Albicula uel Albicilla uno nomine uocari poterit. Legitur quidē Albiculæ nomen inter aues caudam motantes in Gazæ translatione ex Aristotele, sed quod ei respondeat nomen Græcum nullum reperio. Bellonius in Historia auium hanc auiculam non solum Motacillam, sed & Culicilegam (Cnipologon) Aristotelis nominat, cogno-mento cineream, ut à sequente distinguat: addit & Sufuradam uocari, nec exprimit qua dialecto, in Singularibus Obseruationibus à Græcis uulgò Culicilegam non hanc, sed sequentem sic nominari scribit, Est & altera Motacillæ huius cinereæ species minor, eodem teste.

**ITALICE** Balarina, & circa lacum Verbanum Geron.

**GALLICE** Lauandiere, quod circa aquas iuxta mulieres lotrices uersetur, uel quod similiter ut illæ podicæ assidue agitet. Enguane pastre, circa Monspeffulū, nisi id nomen sequenti potius debeatur, Sabaudis Colapa.

**GERMAN.** Wyffe oder graunewassersteltz oder bachsteltz/ Quickstertz/ Wegeistertz: alicubi Klosterfrenwle/ id est Monialis, ab albi & nigri colorum distinctione.



Motacilla flaua, quā aliqui Florum esse putant. Huic quoque nomina conueniunt quęcunq; superiori, flauæ tantum differentia adiecta. Sed habet etiam peculiaria sua nomina. Bellonius hanc Culicilegam (Aristotelis) alteram nominat, superiorem distinguens di causa cineream cognominans.

**ITALICE** Cotremula.

**GALLICE** Bergerette, uel Bergeronnette iaulne, ut Bellonius scribit: quod pastorum instar pecora frequentet. Battequeue, Batteffisue, Battemara. Sabaudis Aufseue uel Haussequeue.

**GERMANICE** Gälbe wassersteltz.





## Ordo octauus.

125

Charadrius, ni fallor, Aristotelis hæc auis est: Gaza Latine  
hiaticolam dici posse scribit, quod circa fluminum al-  
ueos & riuorum charadras, siue hiatus riparum uersari  
soleat. Alibi Rupex ab eodem transfertur. Alia eius  
nomina nescio: nisi ITALICE Coruz: & GER-  
MANICE alicubi Triel uel Griel nominetur, ut  
quidam nobis retulerunt.



Σ iij

PORPHYRIONIS ET HORTVLANAE PICTVRAS SERO

nacti sumus, quare extra suos Ordines posite sunt. Hec ad Ordinem sextū post Alaudam  
refertur poterit, ille ad Ordinem tertium post Gruem.


Porphyrio HISPANICE Telamon.

GERMAN. Ein frembder vogel / möchte in Tütsch genennet  
werden ein Purpurvogel: darumb das er die füß vnd schnabel  
purpurfarb oder rothacht hat / die fäders an gangen lyb sind  
blaw.



Hortulana, ut circa Bononiam uulgò uocatur. Fortè Miliaria ueterum.

ITALICE Ortolano. GER. Ein frömder vogel/in Italia gemein  
vmb Bononi: mag in Tütsch genent werden ein Wetscher gilbling.



### AVIVM ORDINES OCTO

fecimus: qui sunt,

PRIMVS, De auibus rapacibus carniuoris diurnis,

II. De rapacibus carniuoris nocturnis.

III. De cæteris auibus aëreis seu uolacibus, quæ rapaces non sunt: & primū de maioribus, deinde de reliquis mediæ magnitudinis. Minores ad ordinem quartum differuntur.

IIII. De generis eiusdem auibus minoribus (siue auiculis,) frugiuoris primum, dein uermiuoris.

V. De terrestribus seu de humiuolis auibus, quæ pulueratrices sunt: & primū de mansuetis, quibus etiam columbas adnumeravi ex sententia Aristotelis, etsi Gybertus Longolius columbas inter aues pulueratrices rectè numerari non putat.

VI. De pulueratricibus feris seu syluestribus, maioribus primū, quæ ferè gallinacei generis sunt: deinde minoribus.

VII. De auibus aquaticis Palmipedibus: quæ uel in aquis natant, ut Anatum & Mergorum genera: uel circa aquas uolitant, ut Lari & alia quædam. His adduntur etiam non palmipedes, sed circa aquas uolare solitæ, ut ripariæ.

VIII. De auibus aquaticis illis, quæ non in aquis, sed circa aquas degere solent, & circuire potius quàm circumuolare: ut cum alia quædam, tū gallinulæ aquaticæ uel trochili aquatici à nobis in genere dicti. sunt autem fidipedes omnes, non palmipedes, & plerèq; cruribus longiusculis. Postremo de motacillis quibusdam.

FINIS.

L iiii



## CL. V. IOHANNI PARKHVRSTO.

ECCLESIAE CLIVIENSIS IN ANGLIA

ANTISTITI, DOCTRINA ET PIETATE INSIGNI,

Conradus Gesnerus Tigurinus S. D.



Vanissima illa recordatio rare benignitatis et iucundissima comitatus tue, aliarumque virtutum ac eruditionis eximia, (quibus mihi etiam inter ceteros qui hic sunt eruditos postremo, dum in clarissimi theologi Rod. Gualtheri edibus per annos quatuor et amplius, assatim frui licuit,) ut sapissime in animum mihi subit, ornatissime Parkhurst, ita mirificum tui desiderium subinde excitat. Atque hoc ipsum est, quod nunc te, quamvis tanto terra marisque intervallo remotum, ac dulcissima patrie Dei gratia restitutum, aliquo munusculo ut salutem, et memorem tui futurum perpetuo animum delectarem, inuitat simul ac impellit. Accipe igitur latissima illa candidissimaque fronte, (qua viros bonos et amicos tuos exhilarare soles: quam ne exilium quidem illud, quod Verbi Dei gratia fortissime tandem sustinueris, tibi excusit,) hanc de aliquot Anibus quantulumcumque Accessionem, argumentum doctrinae et praestantia tua longe inferius, non iniucundum tamen spero tibi futurum. memini enim te aliquid nostris aliquando siue Musis siue nugis tribuisse. Quod si auctoritate tua effeceris, ut viri aliqui docti apud vos, illarum auium quae in Anglia reperiuntur ultra eas quas hic exhibui, effigies mihi communicent, librum hunc aliis tuis ipsis iconibus, et alijs forte (si quas aliunde interim nanciscar) Domino Opt. Max. vitam largiente, augendum curabo. Hoc autem felicissime omnium praestare mihi poterit Gulielmus Turnerus vester, vir multijuga eruditione insignis: qui primus fere nostro seculo (ceu Phoenix quidam ex cineribus eruditae antiquitatis enatus) Auium historiam suis scriptis magna cum laude illustravit. Poterit et Io. Caius, medicus ille et philosophus summus: a quo imagines tum Auium tum aliarum animantium, una cum descriptionibus accurate ab eo per scriptas, hactenus permultas accepi. sed neq. Io. Falconerus, ut spero, theologus simul et medicus praclarus, mihi deerit. His Anglia vestra ornamenti ut meaeque studia etiam atque etiam commendes, vehementer te rogo. Sic enim fiet ut Bellonio Lutetia apud Gallos, Benedicto Textore Geneva inter Sabaudos, Gesnero autem tuo in Helvetijs, Auium historiam excolentibus, Dei architecti et creatoris omnium bonitas ac sapientia immensa, in hac tanta varietate naturae, hoc in genere vel maxime vocaliusque se exerentis, plenissime cognoscatur. Nec est quoddam aliquis metuat vel obijciat, multis et magnis libris ingenia obrui. quod studiosius enim hac inquiruntur, eo magis subinde, et nomina singulis conuenientia, et naturae deprehenduntur: unde fiet, ut exoriatur proculdubio breui aliquis, qui nostris hisce praeuijs laboribus adiutus, veriora utilioraque quam breuissimè omnia complectatur: ad quod efficiendum ego viam et aditum alijs sternere ac preparare, quoad vixero, non desinam. Utinam verò hoc breui ac bonis auiibus aliquis perficiat. VALE vir clarissime, cum uxore honestissima et amicis omnibus. Saluere cupio apud vos, praecipuos doctrina, pietate auctoritateque viros, dominos mihi honorandos, Robertum Horn, Io. Iuellum, Thomam Samsonum, Iacobum Pilkintonum, Richardum Chambers, Thomam Leauer, Thomam Spenserum, Laurentium Humphrydum: et quos iam prius nominavi: et insuper alios pios ac eruditos viros, qui me noverunt aliquando. nomina enim singulorum iam non occurrunt. Salutant te et illos omnes ecclesiae nostrae antistites et ministri, imprimis Rod. Gualtherus hospes tuus, et Henrychus Bullingerus cum tribus generis, Ludouico Lauatero, Huldrico Zuinglio, et Iosia Simlero: ite Petrus Martyr, Io. Vuolphius, Io. Frisius, et alij viri boni. Iterum Vale. Tiguri, quinto Kal. Martias, Anno salutis M. D. LX.

## AD LECTOREM.

**HACTENVS**, benigne Lector, Avium Eicones prius etiam editas, dedimus: nomenclaturas tamen aliquot addidimus aut emendavimus, (ex collatione praesertim nostrarum Iconum cum ijs quas Bellonius in Gallia sua Avium historia dedit, quantum per angustiam temporis licuit,) & alicubi brevissimas descriptiones, ne nimium chartae uacaret. Deinceps aliquot novas non editas hactenus a nobis aut alijs, per amicos nacti, subiiciemus: & descriptiones quibusdam addemus uberiores paulo, quod ex in volumine Avium historiae non reperiantur.

## AD ORDINEM I. DE AVIBVS

rapacibus carniuoris, diurnis,

**HALIAETVS**, id est, Aquila marina: quae plurimum damni adfert sua piscium voracitate, in aquis marinis praesertim. Est genus Aquilae paruum, inquit Albertus, quod Aquila piscium vocatur (à Germanis.) Huius pes alter duos membranis uinctus habet, ad natandum idoneos: alter fissus, ad apprehendendum, &c. Idem recentiores quidam parum Latini de Aurifrigio aue scribunt: quod nomen ab Osifrago corruptum suspicor, (sicut & Gallicum eius nomen,) non quod, aius eadem sit, sed quia similitudo, dubitari potest. In eicone quam danius à Io. Caio Anglo medico praestantissimo communicatam, similiter in utroque pede fissi sunt digiti, nullis iunctis membranis: quod itidem in Bellonii pictura apparet. ¶ Haliaetos (inquit Io. Caius) id genus aquilae est, quod ex mari lacubusque praedam querit, unde nomen inuenit. Is magnitudine Milui est, capite albis & fuscis distincto lineis, ut melino: rostro aquilino: oculis in medio nigris, in ambitu aureis: lingua ferè humana, nisi quod ad radicem utriusque habet appendicem: colore per summa aësturi, per ima albo: gutture maculis notato ruffis ut & uentre, pectore medio pure candido: crure crasso & squamoso: pede uncinquo & coruleo, digitis quatuor per superna ad dimidiam longitudinem etiam squamosis, ad reliquam incisiss, per inferna asperis & aculeatis tenacitatis causa: & his tam ualidis, ut flexos nix ulla ui extendas. Praedator is est piscium, discissis decidentis corporis impetu aquis, ex eisque uiuit, & quamuis ex pisce uiuit, fidipes tamen est utroque pede, non altero palmipes ut uulgus putat. Supra magnitudinem corporis alae longitudo est, quae ad pedes Romanos duos & digitos undecim extenditur. Inoleuit opinio ista apud nostrum uulgus in Britannia, eam inesse uim naturalem huic aui, ut quem conspexerit piscem, eum se quam mox re supinare & conuertere, atque ad summam aquam ascendere, in eaque fuitare ut sopitum, quo facilius praeda sit uolanti. ideoque eius adeps studiosius asseruetur a nostris piscatoribus, quod eandem uim habere creditur. frequentes sunt apud nos in maritimis locis & Vecti insula. Nostrum an Osprey uocant. Moribus placidus est & tractabilis, & famis patientissimus. uixit enim septem dies sine cibo, & in alta quiete: nisi si hoc non mos fecit sed famer, quae omnia domat. Carnem oblatam recusauit: piscem non obtuli, quod cum ex hoc uiuere didici. Caro illi nigra est.

**ITALICE** Aguila piombina, id est Aquila plumbina, ab eo quod è sublimi in aquam praecipit plumbi instar recta feratur: quod in mediterraneis etiam circa stagna facit Aquila anararia dicta,

**GALLICE** Osfraye uel Ostraye, ab Osifrago nimirum corrupto nomine sicut diximus. Poterit etiam Aigle de mer uocari. A Burgundis audio Crot pecherot, id est, Coruum piscatorem dici.

**ANGLICE** Osprey, corrupto nimirum Gallico nomine.

**GERMANIS** maritimis Vshâten / nostri scriberent Fischehnen / Fischeadler / id est Aquila piscium, Mag auch ein Uccerader genennet werden.



## AD ORDINEM II. DE AVIBVS NOCTVRNIS.

Caprimulgus, Aegothelas, depictus ad sceleton à Petro Bellonio nobis donatum, magnitudine ferè Merulæ, hoc est, dupla q̃ hîc exprimitur. Rostrum ei breue, exiguum, tenue, superiori eius parte leuiter adunca. extremitas acuta & angusta est, ad caput ualde latū. fauces amplæ. Crura ad pedes usq; hirsuta. Digiti pro portione perparui & teneues. Vnguiculi illius qui medium digitum prælógum armat, squamæ ab altera parte serratæ sunt. Cauda, ut apparet, longa. Color toto corpore uariis, partim fuscus, partim maculis ruffis distinctus: in cauda dorsoq; & minoribus alarum penîs admodum uariis & punctis notatus. Species tota nonihil ad Apodem uel Cypselum accedere uidetur. In libro quidem de auibus Gallicè edito, aliam autem Vlularum opinor generis, pro Caprimulgo exhibuit Bellonius; de qua leges suprà pag. 16. postea uero illum, quem hîc damus, ceu ueriores agnîtum ad me misit; cuius antea etiam penâs, Caprimulgi nomine à doctissimo Turnero acceperâ. Horî ego auctoritati facîle acquiesco.

GER. Wagent Wilch  
fuger/oder Weismelcher  
genent werden/den Tei  
schen (so wil mir ietz zu  
wissen) vnbetâr: wird  
erwan in frantzrych ge  
funden.



## AD ORDINEM III. DE AVIBVS VOLACIBVS, QVÆ

rapaces non sunt, maioribus ac medijs.

PICA Bresillia, cuius rostro Io Ferrerius Pedemonianus summæ eruditionis uir me donauit, quod hîc expressi, reliquum corpus ex Gallæ Antarcticæ descriptione Andree Theueti Gallicè edita adieci. Rostrum hoc permagnum (inquit Ferrerius) auis est cuiusdam ex Bresilla regione allatum: non maioris (ut referunt qui ex illis locis ad nos reueruntur) Pica nostra. Is qui mihi hoc rostrum perulit, eam autem refert nutriti pipere: quo quidem uoracissimè repletur, & non digerit, sed statim egerit. atq; eius piperis egesti magnum apud illius regionis incolæ esse usum, potius quàm alterius ex arbore recenter collecti. Persuasum etenim habent, uim piperis illic maximam, sic ab aucula domari, ut minus uentes eo lædat. Ex plerag; alia de eadē aue referunt, quæ omnia an uera sint, non facîle dixerim. Hæc ille, qui postea etiam pellem de pectore cum plumis aureo uel croceo colore splendidissimo pulcherrimog; insignibus, (reliquum corpus nigrum est, nisi quod caudæ initium & extremitas rubent,) ad me misit. Rostrum ei ferè crassius & longius esse quàm reliquum corpus tradit Andreas Theuenus: quod eò facilius credimus, quoniam tenuissimū instar membranæ, & ferè pellucidum, leuissimūq; & cauum est, aërisq; interni capax: quamobrem hoc etiam ei peculiare, quodd odorandi meatu careat. in tanta enim tenuitate ut facilius penetrant odores; ita si quid apertum fuisset, facîle frangi posuisset rostrum, quod ideo etiam denticulatum à natura factum uidetur, ut minore ui aliquid secaret. An uero etiam aër obiter circa hos ueluti dentes, quibus rostrum penitus claudi prohibetur, se infinat ad fauces & arteriam? Auis ipsa ab hac rostri magnitudine Buthynchus aut Ramphætus (sic ut pîsces quidam) appellari poterit. Toucan ab Americæ incolis uocatur, Lege Theuetum cap. 47. libri iam citati.

GERM. Ein Indischer vogel/glych vnseren Zegersten/efgnomē den schnabel. Ein Pfeffervogel/Pfefferfraz.



Morin-



Morinellus Anglorū, cuius effigiem & descriptionem Io. Caius Anglus ad me dedit: Mitto (inquit) ad te etiam Morinellum auem, nobis cum Morinis communem. Stulta admodum est, sed in cibis delicata, & apud nos in summis delicijs. Capitur noctu ad lumen candelæ pro capientis gestu. nam si is expandit brachium, extendit & illa alam: si is tibiam, & illa itidem. Breuiter quicquid gerit auceps, idem facit & illa, ita humanis gestibus intenta auis, ab aucupe decipitur, et rete obuelatur. Auis parua est, magnitudine sturni: tribus tantum digitis anterioribus, posteriori nullo, uertice nigro, genis candidis, Coturnicis fere colore, si cinericei parum admisceas, potissimum circa collum. Morinellū uoco duplici de causa, & quod auis est apud Morinos frequentissima, & quod auis stolidā est, quæ stultitia Græcis *μαρῶν* dicitur: eā ob rem nostri Doterelle uocant.



GERMAN. Ein vogel gemein in Engelland/ Doterelle genannt: möchte von seiner thöheit wägen ein Thor genannt werden/ &c.

Passer solitarius à recentioribus, Alberto magno & alijs, hodieq; uulgò Germanis, nominatur Merulæ genus fuscum, minus Merula, suauissimè canorum: cognatum, nī fallor, Cyano, hoc est Merulæ cœruleæ, tū genere & magnitudine, tum cantus suauitate, tum loco: quoniam similiter in saxis, præsertim montium, degit, unde Cyanū Græci hodie uulgò Petrocosphyphum uocant, Germani à colore *Blawvogel*. Merula hæc fusca, quoniam super tectis & saxis solitaria cantillat, Passeris solitarij nomen aliqui indiderunt: ex sacris literis nimirum: quoniam Psalmo 102. Passer solitarius in tecto nominatur. sed rectius Merulam solitariam, q̃ Passerē solitariū appellaueris: quanq̃ Merulæ omnes ab eo denominantur, quod meræ, id est, solæ uolitent. Aristoteles Merulam fuscā appellat, nos aliud quoq; genus Merulæ fuscū habemus, montanum uulgò cognominatum, quod cantus gratia nemo alit. Non reperitur in nostra regione Passer hic solitarius: sed ab Italis aut Rhætis, qui nobis transalpini sunt, mittitur, Mediolani & Geneuæ in foro aliquando magno precio uendi audio. Falconarius Friderici imperatoris ad remedia quædam utitur simo passeris Indici siue solitarij: uel eius loco, passeris communis, Iconem eius ab Aloisio Mūdella medico eximio missam, in Auium historia etiam posui, quæ in prima Iconum editio ne nescio quomodo nos subterfugit.



TALICE Circa Tridentum Merulo solitario nominatur. Albertus Romæ Merulum stercoreosum uocari scribit, quod in latrinis antiquis & rimosis degat, iuxta Larium lacum uel hanc, uel Cyanum potius, Passerem montanum uocant,

GERMAN. Passer solitari/ nomine ab Italis, à quibus petunt hæc auem, accepto. Posset autem uocari ein Steinamssel: uel ein grawe Steinamssel/ Cyanus uerò ein blawe Steinamssel.

Cyano Aristotelis hæc dum scribo, iconē Godefridus Seilerus Augustanus, admodū adolescens & supra ætatem eruditus, (Geryonis Seileri nobilissimi medici & Archiatri Augustæ, maximæ spei filius, & Raphaëlis I. C. præstantissimi, Comitissæ Palatini frater,) ad me misit, ad uiuū depictā, unā cū descriptiōne, quam hīc subiicio. Cærulea auis (der Blawvogel/ oder Eysvogel: sed posterius nomen, Alcyoni fl, ut quidam uocant, potius conuenit) uelcitur grossiori illo & minus contrito quod à farina hordeacea seiungitur, ac cum lacte recenti commixto, Cantu suauī admodum atq; iucundo, uarij q̃ generis. multos enim maxime q̃ uarios sonos à cæteris auibus, quibus cum fuerit, exiguō temporis spacio, si præcipuē tenella ac nuper è nido recepta sit, discere solet. atq; ita cantus eius multiplex est, ut ad certum quoddam genus referri nequeat. Qui pullos è nido suffurari conantur, obuelare penitus faciem coguntur propter parentes: qui suos tueri strenuē conseruare q̃ student, cui rei dum intenti omni studio sunt, & hostem depellere conantur, oculos tantummodo eius obseruant, quos si uel minimum attingere liceat, gaudet ac uictores sese agnoscunt. oculos enim hominis confodere rostro conantur.



AD ORDINEM IIII. QUI EST DE AVICVLIS.

Godefridus Seilerus Augustanus, unā cum Cyano superius exhibitō, CHLORIDIS peregrinæ etiam, quæ è Canarijs insulis aduehitur, imaginem dedit: quam hoc loco posuissē, nisi per omnia Chloridis illam speciem, quam uulgō Citrinam nostri cognominant, suprā à nobis positam, coloribus, figura, magnitudine, & (ni fallor) etiam uoce cantuq; ita referret, ut uix distinguas. Velcitur (inquit) auicula hæc semine lini uel papaueris apud nos: in natali autem solo, saccharo incocto pascitur. Cantus ei omnium dulcissimus: uox ualde canora, ac mirum in modum sonora: qua inter omnes alias similes excellit.

Ad Ordinem

AD ORDINEM VII. DE AVIBVS AQVATICIS PALMIPEDIBVS.


Anatis Indicæ rara quædam species, cuius eiconem Io. Thannmyllerus F. chirurgus egregius, Augusta Vindelicorum ad me misit. Caput ei albicat, ut pictura ostendit, Rostrum, crura, cauda, & extremæ longissimæ alarum pennæ, atrii coloris sunt. reliquum corpus, concolor ferè, rufum aut rubricæ fabrilis colore, (non quæ rubricæ est, sed lineæ ex ea ductæ,) alarum tamen partes quædam albicant: in masculo aliquid etiam puniceæ & uiridis coloris per alas spectatur. Collū superius premum angusta linea nigra ambitur.

GERMANICE Ein besondere frembde art der Indischen Enten.





Anas Indica alia, cuius picturam doctissimus Cardanus misit. Corpus undiq; nigris pennis integitur, candidis alarum maculis exceptis per transuersum & secundum longitudinem: & candidis in capite, collo ac pectore punctis: sicut in icone à prælo statim apparet, nullis à pictore coloribus inductis, sed crurum & rostri color cinereus uel corneus est. Pars oculis subiecta, & rostri posterior pars cum tuberculo illo rotundo, ut apparet, egregie rubent. Anatis iam descriptæ figuram integram posui: alterius uerò quam Rondeletius misit, caput duntaxat cum collo expressi. Maritima est (inquit ille in epistola ad me) in stagnis degēs, & cristata, satis rara apud nos, nec aliud addit, nisi quòd ex Anatum genere esse suspicatur, in quo facile ei assentior, cum palmipes Anatum instar sit, & rostrum simile habeat: cui hoc peculiare in Anatum genere quòd resimium est: tuberculum rotundum cum Indica ei adiuncta commune habet, à quo globirostram aut sphærorhynchum cognominare licebit, distinguendi causa ab alijs Anatibus. Crura etiā ei pro portione q̃ alijs proceriora uidentur, ea roseo (rosæ sylvestris) ferè colore rubent, sicut & rostrum cum tuberculo. Caput nigricat, non sine uiridibus exiguis maculis. In pectore color rubricæ fabrilis est: albus in collo: reliquum corpus albo fuscoq; distinctum.




Bernicla

**Bernicla** uel **Branta** Anglorum, quam pulchre depictam nobilissimi medici Io. Kentmannus Torgæ Misenorum, & Io. Caius Londinō Angliæ ad me misit. De ueteri eius nomine non constat. Eliota Anglus Chenalopecem suspicatur esse **Barnaclam** (sic ipse scribit) Anglorum, Turnerus uerō (cuius maior apud me auctoritas) aliam autem mediæ inter anserem anatēq; magnitudinis, alis rufis, in cuniculorum foueis more uulpium nidulantem, **Bergander** (quasi montanam anatē, quod in excessarum rupium cauernis nascitur) uulgo in Angliā dictam, Chenalopecem esse credit. Chenerotē uerō Plinij (si recte Chenalopeces & Chenerotes apud Plinium leguntur: alia enim lectio est, Penelope & Chenalopeces, quibus lautiores epulas Britannia non norit) uel **Berniclam**, uel **Anserem Bassanum** Scotiæ (quem exhibuimus supra, pag. 83.) esse consicit. **Bernicla** uocabulum quid sibi uelit non habeo quod dicam: consicio quidem ē ueteri Britannica lingua, quæ hodieq; Vuallorū in Angliā, Britonum uerō in Galliā est, relictum esse: quoniam Armoricū, id est, Britones, eo etiam nunc uiuunt. At **Branta** nomen (Caius Brendinum anserem mihi uocauit) originis Germanicæ uidetur, Anglofaxonibus in usu, ab atro ceu tititionis colore factum: qui & ceruis & uulpibus quibusdam apud Saxones nomen fecit. Ater enim hic color in capite eius, rostro, cruribus, collo, dorso, pectoris parte caudaq; insignis est: in alarum parte & uentre cinereus: post oculos macule albe sunt: pectoris etiam pars & laterum interior candidat. Albertus Magnus de his auib; scribens, ut ex descriptione liquet: Falco (inquit) quidā dicunt eas idcirco nominari **Baumgens**, (id est Anseres arborum,) eo quod ex arboribus nascantur, uel putridis in mari lignis, asserentes a nemine unquam has aues uisās coire uel oua parere, sed hoc omnino absurdum est. ego enim & alij complures mecum uidimus eas coire & oua fouere, ac pullos alere, & cetera. Ego in historia Autum Turneri uerba copiose retuli, quibus ut persuader has aut similes aues ē putredine gigni aut quomodo cunque ex arboribus aut lignis posse, ferē inducor. Idem in epistola ad me: **Branta** (inquit) Anserem palustrem ualde refert: differt tamen, quia breuior est. a collo, quod rubescit nonnihil (in nostris quidem picturis nihil ruboris apparet) ad medium usque uentrem, qui candidat, nigra est. Anserum more segetes populatur. In Vualia (quæ pars est Angliæ) in Hybernia & Scotiā aues istæ adhuc rudes & implumes in litore, sed non sine forma certa & propria auis, passim inueniuntur. Est autem præter hanc alia etiam auis, quæ originem suam arbori ad litus Scotiæ maris refert acceptam. Sic ille, est autem altera hæc auis, quam Scoti **Clabis** uocant, suo loco a nobis exhibita: quam in mari ē ligno nasci Hætor Boethius (cuius uerba in Autum historia recitat) tanquam testis oculatus plene affirmat. Anates Oceani Britannici (inquit Iulius Cæsar Scaliger, enarrans librum primū Aristotelis de planis,) quas **Aremorici** partim **Crabans**, partim **Bernachias** uocāt. Eæ creantur ē putredine naufragiorū, penduntq; rostro ad matrīce, quoad absoluta decidunt in subiectas aquas, unde sibi statim uictum querant: misendo interea spectaculo pensiles, motantesq; tum crura tum alas. ¶ Non uerō in maritimis tantum tractibus **Bernicla** inueniuntur, sed in mediterraneis quoq;: ut Sommeualdi in ditio ne illustri comitis Sulmenfis, sex miliarū interuallo distante Torgæ Misenorū: ubi in arborib; nidulantur, ut doctissimus Kentmannus noster obseruauit. ¶ Bellonius Historia auium lib. 3. cap. 5. eandem auiem describit, quanquam rostrum longius pingit, & an sit **Cravant** **Aremoriorū** dubitare uidetur, ego omnino eadem esse auiem absq; dubio dixerim, cōueniēte prorsus descriptione, & c. (Nomen quidem **Cravant**, Germanicum uideri potest, quasi **Grauent**, id est, Anas fusca.) Oua tanē eas parere et pullos excludere se obseruasse ait, & falsam esse persuasionem, quod ex malis nauium putrescentibus oriuntur, a ueteribus quidem Chenalopeces, id est, Vulpesferes dictas putat, cum in singularibus Mergi genus quod Galli **Fibrum** nominant, (ipse in Historia auium Vriam,) Chenalopecem appellauerit. Est autem Chenalopeces (ni fallor) Plinij codices habent, in summis Britannorum deliciis: **Bernicla** (Turnero teste) insuauior est, & diuitibus parum expetitur. ¶ Quæ Io. Caius de **Bernicla** seu anserē Brendino ad me scripsit, nunc non occurrunt. Hoc animaduertendum, aliud etiam Anseris **Bluctris** genus circa Argentinam similiter **Baumgass** nominari, cuius iconem dedimus supra.

**GALLICE** apud Armoricos **Crabant**, **Cravant**, & **Bernachia**, ut dictum est.

**GERMAN.** Ein **Baumgans**/wie wol auch ein andere art wilder gansen an etlichen orten also genestet wird.

**ANGLICE.** **Bernicla**/ **Bernicla**/ **Branta**/ **Brendin**.



Phœnicopterus, qualem doctissimus Rondeletius mihi transmissit, degit in medijs stagnis marinis. Vescitur cochleis, pisciculisq; &c.  
 ¶ Mirum est huius tam pulchræ & eximie avis nomen ab Aristotele taceri, cum Aristophanes, qui vixit eadem ætate, meminisset.  
 sed Grecis etiam rarum esse hanc avem puto. Nam Heliodorus Nilii incolam eam facit. Bellonius quidem eandem Aristotelis Glottidem esse suspicatur: ego uerò ijs quas Gallinulas aquaticas nostri uocant a quibus Glottidem adnumero, quæ omnes fidi pedes sunt.  
 GALLICE Flammand, Flament, Flambant: à corporis proceritate, quali solent esse Flandri, uel à colore flammineo.  
 GERMANIS ignotam puto avem, sicut & Gallis ad Oceanum Bellonio teste, quare fingo nomen interpretatum ex uetere Greco eius, Latinis etiam recepto nomine: Nam ein Rotseck oder Rotuogel genennt werden/ dann er rot ist am schnabel/schnecflen/vnnd secken/ außgenommen die schwingfädern/ welche schwarz sind/ &c.





## AD ORDINEM VIII. DE AVIBVS AQVA

TICIS FIDIPEDIBVS.

**H**AEMATOPVS, quem pingendum curavi ad sceleton, à præstantissimo Lugdunensi medico Jacobo Dalechampio, omnibus ingenij & doctrinæ virtutibus ornatissimo uiro mihi donatum. Mitto (inquit) & do auem non admodum frequentem, à te nusquam memoratam in copiosissimo uolumine De auibus, palustrem & aquas etiam profundas adeuntem, quod ex crurū altitudine intelligi potest. Hematopoda siue Himantopoda (nam utroque modo apud Plinium in alijs atque alijs exemplaribus legitur) censet esse Benedictus Textor: nomine conuenienti, siue crurū sanguineum colorem, siue obsequiosam ferè lori modo flexilitatem speciemus. Hæc ille. ¶ Porphyronibus rostra & prælonga crura rubent, hæc quidem & Himantopodi multò minori, quamquam eadem crurum altitudine nascitur in Aegypto, insitit ternis digitis, præcipuum ei pabulum muscæ. uita in Italia paucis diebus, Plinius lib. 10. cap. 47. quæ descriptio ei quam exhibemus aui omnino fauet, quod ad nomen, meliores codices non hematopodi, ut alij quidā, sed himantopodi habent, aliqui Hemantopodi, quod ab Himantopode corruptum facile apparet: nā si ab hæma, quod est sanguis, deriuetur, n, literam habere non potest. Nos etiam in Paraphrasi Ixeuticorum Oppiani Himantopodes legimus. *Ixeuticorodæ* aues (inquit) nomen à crurū tenuitate habent, hoc nouum in eis, quod maxilla inferiore fixa, superior solum in ipsis moveatur. Sic ille, sed in aue hic proposita maxillarū motus nihil ab aliarum auiū natura uariat, ut ex articulis in sceleton apparet. Himantopodis quidem (hoc est Loripedis) nomen probo, rei etiam ipsius argumēto: uix enim alius auis tam procera crura cum tanta exilitate reperias: sanguinea uerò plurimum. ¶ Quod ad partiū magnitudinem & colorem, sceletos sic se habet: Rostrum digitos ferè quatuor longū est, caput paruum: collum digitorum v, reliquum corpus (quod leue & gracile est, instar auium palustrium ferè quas Gallinulas aquaticas uocamus) digitorum vi. cauda iiii. crura x v. Alarum longitudo parū excedit dodrantē. Color rostri nigricat, in capite & collo prono fuscus: dorso et alis niger, paucos uiri di admixto, si diligentius intuearis, cauda cinerea. Partes pronæ omnes, & latera quoque, albi coloris sunt. Crura sanguinea: digitis dūtaxat ternis, (sic ut in Bistarda, Oenade Rondel. Mori nello Caij, Struthocamelo, Pluuiali, et Cana Petiera Bellonij, eiusdemque Pica marina:) quorū medius longissimus est, breuissimus interior: iūgitur autē medius cum exteriorē breuissima membranula tanquam palmipedū. Poplitum cauitas insignis est, articulo tam flexili ut in sceleton etiam tibia ad femur tota facillimè reflectatur. Videtur sanè non cursu tantum ualere, sed etiam uolatu hæc auis: quoniam oblonge eius alæ sunt, ita ut longissimæ earum pennæ caudam seu orrhopygium duobus aut amplius digitis excedant. ¶ Alia auis est, quam pro Hematopode Bellonius exhibet lib. 4. cap. 11. De auibus: quam à Gallis Pie uel Becasse de mer, id est, Picam uel Scolopacem marinam uocari scribit: quod rostrum instar Scolopacis habeat: in alis uerò transversam maculam albam ut picæ, & c. cruribus rubentibus quidem, sed breuioribus crassioribusque quam Himantopodis nostræ.

GERMANICVM nomen fingendum est, utpote auis peregrinæ. *Ein frömbder vogel/ wirt etwan in Franckreych gefangen/ doch selte: mit roten/ langen vñ gar rissen schencklen: mag ein Riemling genennet werden.*

In Himantopodem Tetrastichon nostrum,

Loripedem Graio uocant me nomine: quanquam

In ripis celeri curro citata gradu.

Hematopon alij: nullo quæ nomine mallet

Nota ornithophagis uiuere sola mihi.

FINIS.



# INDEX IN AVIVM NOMI- NA. QVAVM PICTVRAE HOC IN LIBRO EX-

HIBENTVR, O. LITERA ADIECTA MENTIONEM

alicuius auis, sed absq; icone, significat.

LATINA,					
A.		anser ferus	72	rus	120
Acanthis 44. Bellonij		anferes marini Scotici	82	branta Anglorum	135
45		anthus	98.0.	brendinus anser An-	
acanthis recentiorum		Bellonij	41	glorum	135
Gracorum 44		apiafter	98	bubo 14	buteo 9
accipiter, uel Accipiter		apus	51	butherius	9
maior	7	apus minor	52	butorius	120
accipiter minor	7	aquila	3	C.	22
accipiter fringillarius,		aquila anataria	6	Calandra	70
palumbarius	7	aquila barbata	12	calidris	114
accipiter palumbarius 10		aquila heteropus	4	capercalze Scotica	a-
agithalus maior & mi-		aquila mar.	129	uis	82
nor	45	aquila Scythica	4	capra, capella	99
agithus	43	aquila uulturina	5	caprimulgus	16.130
agocephalus	114	ardea uel ardeola pulla	117	capus, capo	54
agolius	15.0.	ardea uel cinerea	118	carduelis	43
agotholas	130	ardea albae tres	118	caryocatactes	25
afalon	11	ardeola candida Bello-	92	cafsita	7
arx	99	ardeola candida Bello-	92	cenchris	8
afra auis	61	ardea cirrhata uel crista	37	certhias uel certhius	
alauda non cristata uel		ta maior	117	charadrius	125
gregalis	70	ardea stellaris maior	117	chenalopex	135.0.
alauda cristata uel terre		120.119.		cheneros	135
na	70	arquata maior	113	chlorion	37
alba frons	87.0.	arquata minor	103	chloris	45
albardeola	118	asclopacion	112	chloridis species alia	
Bellonij	92	asclopas	110	44.45. alia e Canarijs	
albicilla, albicula	118	after	43	132.0.	
124		astragalinus	43	cinclus	112
alchata	67	astur	7	cia montanina	42
alcon fluuiatilis	100	atricapilla 47. Bellonij		ciconia	121
alcyon maior & muta		49		ciconia montana	5
Bellonij 100. minor &		attagen 63. Bellonij		ciconia nigra	122
uocalis ibidem o.		49		cinclus	122
alrachme	5	attagen candidus	65	citrinella	44
aluco	15.0.	attageni congener auis		clanga	6
anas	73	65		clangula anas	79
anas caudacuta	75.0.	auicaca	110	cnfologos	37.124
anas circia	77	auis externa	64	Turneri	37
anas marina quaedam		auis maxima, cui ad ni-		coccothraustes	40
75. alia 74.0.		dum arbor una non fa-		coccyx	34
anas fera torquata ma-		tis est	5	colios	26.37
ior	74	aurifrigius	129	collurio uel collyrio	
anas fera torquata mi-		B.		Bellonij minor 13. ma	
nor	75	Barbates	82	ior,	ibidem
anas fera fusca, media		barliatae	82	columba uulgaris, uel	
magnitudinis	76	basiliscus	49	domestica, albauae, 57.	
anas Indica 37.133. alia		batis	50. & 49.0.	Turricula seu faxati-	
134		berneae	82	lis,	ibidem
anas periezofmene	74	bernicla	135	columba Anglica uel	
anas raucedula	86.0.	bistarda	67	Russica	57
anas strepera	78.0.	bonofa	63	colymbis	89
anser	73	boscas maior	74	Bellonij	77
		bos taurus, botau-		colymbus maior	88
				colymbus minor	89
				cornix	23
				cornix caerulea apud	
				Mifenos	21
				cornix uaria uel cine-	
				rea, marina, hyberna;	
				apud recentiores	
				coruus	21
				coruus aquaticus	84
				coruus syluaticus	22
				corydalus	70
				coturnix	71
				cuculus	34
				culicilega cinerea	124
				altera	124
				curuca, curruca	47
				currucis cognata qua-	
				dam	47
				curuirostra	40
				cyanus	34.132
				cypselus	51
				cypselus minor	51
				D	
				Dendrofalco	11
				drepanis	97
				Bellonij	52
				Dryocolaptes tectius	
				Aristotelis	35
				E.	
				Elaphis	119. & 105.0.
				elorius	113
				emberiza alba	42
				emberiza flaua	41
				emberiza pratensis	42
				epops	31
				erithacus	48
				erythra	108
				erythropus minor	109
				erythropus maior	101
				externa	64
				F.	
				Falcata	116
				falco arborarius	116
				falco niger	10
				fiber Bellonij, ex mer-	
				gis	86
				ficedula	47
				Bellonij	47.49
				ficedulis cognata qua-	
				dam	47
				florus	98.41.124
				fringilla uel fringilla	44
				fringilla montana	44
				fringillago	45
				frons	

# Index.

frons alba	91	hiaticola	135	nor 86, maior ibidem	P.
frugilega	22.0.	himantopus	137	mergus mustelaris	86
fulica	91. & 87.0.	hipparion	86	mergus Rheni	87
fuligula anas	80	hirundo	51	mergus uarius maior	palumbus maior, uel
G.		hirundo tritaria	97	87	torquatus
Galerita	70	hirundo rustica cognomine	11	merlina	11
galgulus	37	mine, uel agrestis, uel	11	merillo, meristio	11
gallina aquatica	91	sylyestris	32.97	merula	32
lica uulgo Italica	A.	hortulana	127	merula fusca	33.0.
lia eiusdem generis		hypæetus	5	merula saxatilis	34
Ibid.		hypoleucos	106	merula torquata	33
gallina Africana seu		I.		merops	98
Numidica	56.61	Ibis alba	121. & 122.0.	merula aquatica uel	ri-
gallina gibbera	56	ibis nigra secundum Bellonij	22	ualis	123
gallina rustica	110.0.	Ionium	116	miluus, miluius	8
Bellonij	63	ibidi cognata auis	37	miliaria Ruellij	43
gallina lanigera	54	inas	67	molliceps	26
gallina uillatica uel uillaris	53	ismerlus	11	monialis	124
gallinaceus	52	ispida	100	monialis alba	87
gallinago	110	iunco	123	monedula	24
gallinagines uel gallinulae aquaticae	100	iunonis auis	55	morinellus Anglorum	131
gallinago minor	112	iynx	38 & 37.0.	morpnus	6
gallinaginis minoris aquaticae (Bellonij) species	123	L.		motacilla alba	124
gallinulae maritimae	114	Lagopus	63.65	motacilla flaua	124
& 115		lagopus uaria	64	motacilla cinerea maior	124
gallinula serica	101	lagopodi similis, maior	60.0.	ior 124. minor o. ibid.	129
gallus, uel gallus gallinaceus	52	lanarius	9	musculus	7
gallus Numidicus uel Mauritanus ferus	61	lanus maior	13	mustelaris mergus	86
gallus palustris	61. syluestris uel montanus maximus	lanus cinereus, mediae magnitudinis	13	N.	
galli syluestris genus nigrum in Scotia	61	larus alb. duplex	95.0.	Nisus recentiorum	7
garrulus	26	latirostris anas maior	80	noctua saxatilis uel latirostris	17
garruligenus alter	27	ligurinus	44	noctua, uel potius noctua genus paru	15
garrulus Bohemicus	27	Bellonij	45	nucifraga	25
gibbera gallina	65	linaria	43	numenius	113
glareana	50	linaria rubra	105	nycticorax, non ueterum	66
glauicum	76	lingulaca	66	sed uulgo sic dictus	66
glottis	105	liua columba	40	circa Argentinam & alibi circa Rhenum,	18
gracculus	24	loxias	48	auis pisciuora	108
gracculus coracias	26	lutea & luteola	45	O.	
gracculus palmipes	84	lycos	24	Ochra	108
& 91		M.		ochropus magnus	103
grus	19	Martinus piscator	100	ochropus medius	107
grus Galearica	117.0.	melampus	107 (nij) 49	ochropus minor	109
grygallus maior	60	melancoryphus Bellonij	56.61	ocnus	120
grygallus minor	60	meleagris	86	oenas	67. & 57.0.
gustarda Scotorum	83	minor	85	onocrotalus	49. ter
gypæetus	5	merganfer	89	Bellonij	92.0. 94
H.		mergulus	89	oripelargus	5
Hamatopus	137	merguli genus alterum	89	orix	63
haliaetus	129	mergulus niger	89	ortygometra	71
harpe	5	mergi cornuti	88	ortygometra Bellonij	90
helorius	113	mergus albus	87	osifraga	11.40
hercynia auis	27	mergus anseri similis	85	osifragus	ibid.
		mergus minimus fl.	89	otis uel Tarda	67. bis
		mergi glaciales uar.	86	otis minor	67
		mergus longirostris minor	14.0.	otus	14.0.



# Index.

phoenicurus	48	rex	49	triorches	9	airon	1:7
phoenicurus species alte-		rex coturnicum	71	tristunculus	8	airon bianco	118
ra	48	rhodopus	100	trochilus	49	ayron negro	116
pica Bressillica	130	riparia Bellonij	52	trochiluaquaticus	100	alodetta	70
pica glandaria	26	ripariola	97	trochilus terrestris	68	alodola	ibid.
alia	27	rostris	100	trizolus	7	anadre	73
tertia	ibid.	rubecula	48	trogodytes Bel.	49.0.	anatre	ibid.
pica marina	80	rubecula saxatilis	34	tryngas	123	anatre d'India	ibid.
pica uaria uel caudata	28	rubicilla	48	turbo	38	anghiron	117
		rubrica	49	turdus simpliciter	29	anitra	73
picus arborarius uel ar-		rupex	125	turdus minor, quem il-		aquila	3
borum cauator, uel		rusticula	110	ladem uel tyladem co-		aquilastro	6
Martius maior	36	rusticula uel rustica per		gnominat, Gaza Ilia		arcase	113
minor	ibid.	dix Martialis, ex con-		cum uertit	28	arcia	110
picus cinereus uel sub-		iectura Bellonij	71	turdus uisciuor uel		arza uola	89
cœruleus	37	rusticula minor	112	maior	30	astur	7
picus maximus uel ni-		rusticula syluatica	111	turtur	66	auoltoio	13
ger	35	ruticilla	48	tyrannus Bellonij	49.	auoleta	93
picus muralis	38			Regulus noster			
picus nidu suspendens		Salicaria	50				
37		salus	43.44	V.		Balarina	124
picus uariis	36	scalopax	110	Vanellus	99	barbaiano	16
picus uiridis	36	scandulaca	37	uespertilio	43	barbastello	17
pilaris	29	schoenicius	123	uinago	67.570	beccassa	110
pipo	36	scolopax	110.112	uiridia	45	beccorocella	93
pipra	36	scytica auis, genus aqui-		ulula	15	beccostorta	93
piscator	100	la	5	ulula genus alterum,		becqualiga	37
piscator regius	100	senator	49	quod quida flammea		becquaroueglia	92
pittacus erythrocy-		serinus	45	tum cognominant	16	becquefigue	47
nus	39	sitta 37 smerillus	11	uria uel urinatrix ma-		bertina	26
planga.		6 smerla, smerlus	11	ior 88 minor	89	berta	26
platea, platealea	92	spermologus 41 22. o.		urinatrix	123	biui	51
& 118. o.		spermologus albus	42	urogallus simpliciter		brusola	37
Bellonij	94	spinus 44. Bellonij	45	uel urogallus maior	58	buba	31
plumbina	89.100	starda	67	urogallus minor	59	bucciario	9
pœcilis recentioru Gre-		struthio	69	urogalli minores in Se-		buso	14
corum	44	struthio Africa	69	prentione	58		
poliopus	104	struthio Libycus	69	upupa	31	C.	
porphyrio	126	struthiocamelus	ibid.	uulpanfer, uide Chena		Canibello	8
prunella	42	struthocamelus	69	loper		canuarola	43
psittacus erythroxan-		sturnus	34	uultur	13	capertorto	38
thus	38	subaquila	5	uultur alpinus que Hel		capo negro	45
pullus aquæ	91	fycalis Bellonij	49	uetij aureum cognom-		capo nero	47
puphinus Anglorum		syroperdix	64.0.	inant	12	capon, capone	54
quadrupes	80					cardellino	43
pygoscels maior	88	T.		Z.		carolo	113
pygoscels minor	89	Tarda. Vide Otis		Zena	43	carzerino	ibid.
pyrrhocorax 23. et 26. o.		taurus	120	GRAECIS hodie uita-		cedron	58
pyrrhulas	48	tercellinus	7	ta quædam uocabula.		celega	41
		tertiolus	7.10	Asarandos	45	cercedula	77
Q.		tetraon minor	59	cothurno	64	cerceuolo	ibid.
Qualea	71	tetraon Plinij	58	petrocossyphus	34.0.	ceppa	42
querquedula uaria		tetraonis altera species		sufurada	124	cesano	81
77. o.		67. & 58. o.		taginnari	60	cesila	51
quiscula	71	tetrax uel tarax Neme-		taos agrios	99	chapelina	70
		siani	67	xylornitha	100	charlot	113.115
Racham	5	traupis	43	ITALICA.		chotronisse	64
ralla 71		Bellonij	43.44	A.		cia	41
rallus terrenus	68.71.	tinnunculus	8	Agrotto	94.118	ciagula	24
recuruirostra	93	torquilla	38	agustapiombina	129	cigno	81
regulus	49	totanus	114.0.	aicta	9	cigognâ	121
Bellonij	49	trichas Aristotelis	29	aigeron	120	cino	81
reputatrix	37	tricellus	7			cion	28

# Index.

cipper	28	frufone	40	legorin	ibid.	perdicè	64
cipperina	70	G.		lerlichirollo	123	perdicè alpeftre	63.65
citrinella	44	Galbedro	37	limofa	114	perdicè bianche de la	
collo torto	38	galedor	95	lodola	70	montaigne	65
colmeftre	64	galetra	ibid.	lodola capelluta	70	pernigona	64
columbo, columba, co-		galleteo de magio	31	lodora	ibid.	pernis alpedica	63
lomba	57	gallina	53	loyetta	7	pernistette	64
colombo fauaro, uel fa-		gallina arcera	110	luganello	44	pescatore	100
uacco uel butaracco	66	gallinella	ibid.	lugarino	ibid.	pescatore del re	98
coroffolo	34	gallinaza	ibid.	lugaro	ibid.	petto roffo	48
coroffolo	48	gallo	52	lupo de l'api	98	pétuffo	48
corbo	21	gallo d' India	56	lufigniuolo	48	piccafiga	47
cornacchia	23	gallo alpeftre	59	M.		picciferro	98
cornice	ibid.	gallo cedrone	58	Maluizo	28	picha	28
coruo	21	gallo de paradifo	31	manucodiata	20	pigozo	36
coruo marino	22	gallo feluatico	58	martino pefcatore	100	picchio	35
coruo feluatico	22	garbella	37	megliarina	41	picciferro	100
coruo fpilato	22	gardellino	43	merlo	32	pico	35
coruz	125	gardellin	ibid.	merlo biauo	34.0.	pipiftrello	17
cotremula	124	gardello	43	merulo	32	piombino	89.108
coturnis	64	gargancf	77	merulo alpeftro	33	pizamolchè	47
couarella	70	garganello	77.87	merulo folitario	132	pola	24.110
crofferon	34	gargea	118	miluio	8	polono	87
cucco	ibid.	garietto	118	morgon	87	polun	91
cucculo	ibid.	garza	117	mulacchia	22	poyana	9
cucho	34	garza biancha	118	munacchia	22	pullon	91
cuco	ibid.	garzetto	ibid.	N.		puniono	57
cutta	24	gaufina	95	Nibbio	8	pupula	31
D.		gaufinello	8	nichio	8	putta	28
Dardano	51	gaulo	100	niggo	ibid.	Q.	
dardo	98	gazza	28	nottola	17	Quaglia	71
drexano	30	gaza ghiandaia uel ghi	26	notula	ibid.	quaiocto	117.119
duco	14	andara	13	O.		quallia	71
dugo	ibid.	gaza marina	ibid.	ocha faluatica	72	R.	
F.		gaza fperuiera	ibid.	ocello d'el ducha	94	Rallo	97
Falcinello	116	gaza uerla	26	ocho, ocha	73	raparino	1
falcon	10	gazzara	28	ortolano	127	ratto pentago	1
fanello	43	gazzuola	ibid.	otorno	64	rauarino	47
fafan, fafano	62	ghiandara	ibid.	P.		re de qualie	71
fagiano	ibid.	ghiandaria	66	Pagone	55	reatin	47
fafan negro	59	giarioli	100	paerizo	41	rectino	49
fafanella	63	girardelli	ibid.	palumbella	66	regazza	28
fafiano alpeftre	59	girono	118	palumbo	57	regetiola falconiera	13
ferbott	48	gyuen	87	paon	99	regillo	49
finett	43	geron	12	paoncello	99	reillo	49
fior rancio	49	gracchia	23	papafigho	47	rendena	51
fohonelo	49	grallo	98	papagallo	39	reuezol	48
folega	91. & 87.0.	grifon	40	papara	73	rhoncas	65
folor	123	grotto	94	parifola	45	rondena	51
folun d'acqua	ibid.	grotto marfno	ibid.	parifola domeftica	45	rondine	51
formicula	38	grotto molinaro	94	45	45	rondinella	51
francolino	60	gru	19	paruffola	45	rondone	51
frangueglia	44	grua	ibid.	paruffolin	ibid.	rofcignolo	48
franguello	ibid.	H.		parozolina	45	rofcignuolo	48
franguel inuernengk	49	Herbey	65	pafon	23	rofcignuolo	48
franguel montagno	49	hortulano	43	paflara	41	ruffey	119
40.44.49		I.		paflera gazéra	13	S.	
fringuello	44	Ieuolo	98	pauon	55	Sartagnia	47
frinlon	45	iurar	88	pauonzino	99	farrella	77
frifon	49	L.		peccietto	48	fcartzerino	45
		Lequila	44	pechietto	ibid.	fcuolo	77
		legora	ibid.	perchia chagia	49	fcricciola	49

# Index.

serin	45	zigognia	121	boutor	120	coulon ou pigeon ra	
finerlo, fineriglio	11	ziguetta	5	bayfard	9	mier	66
spaiarda	41	ziollo	37	buzard	9	crabans	135
sparauier	7	zifila	51		C.	croiseau	66
sparuiero	7	ziuetta	15	Caille	71	crot pefcherot	129
speluiet	23	zorl	23	calandre	70	cueillier	92
sperga	88	zueta	15	canard	73		D.
spinzago	113			canard d'Inde	73	Dame	16.18
spinzago d'aqua	93	HISPANICVM.		cane	73	deux pour un	112.0.
sportegliono	17			cahe a la teste rouffe	76	dixhuit	99
fiarna	64	Telamon	126	cané petiere 63. et 60.0.		diable	91
stolcho	58			& 67.0. bis		duc uel grand duc	14
stolgo	58	GALLICA.		caffenoix	25	duc moyen	14.0.
stolzo	58	Agasse	28	castagneux	86.89		E.
stornello	34	aigle 3. de mer.	129	cedrin	45	Effraye	16
storno	34	aigrette	118	cercella	77	emerillon	11
stortacoll	38	airon	117	cercerelle	8	enguane pastre	124
strutza	69	alebranda	77	cercerella	77	epeiche	36
sturnello	34	alouette	70	cerifin	44	efchelette	38
suffuleno	48	angel	67	chahuant	16.0.	efcorffle	8
		arbenne	65	chahuant petit	16	efmereillon	11
T.		arneat	13	chappon	54	efparuier	7
Taccola	24	artre	98	charderaulat	43	efperuier	7
taccola	120	auffecue	124	chardonneret	43	effourneau	34
tarabuffo	45	auffour	7	chaffetont	14		F.
taranto	103	auffrouche	69	chat huant	14	Faifant	62
tarangolo	113	autruche	69	cheualier aux pieds		faifant bruyant	58
tarlino	24		B.	rouges, 114. 115. aux		farfoute	49
tatula	113	Barge	113.114	pieds uerds	114	faulcon	10
terlino	120	batelefsifue	124	cheueche	15	flammand	136
terrabufa	7	battemara	124	choca	24	flambant	136
terzolo	47	battequeue	124	choche pierre	40	flament	136
testa nera	29	becaffe 110. de mer.	137	choquar	23	foucque	91
tordo	66	becaffe petite	112	chouca	24	fouette rouffe	49.0.
torquato	113	becasseau	112	chouca rouge	23	foulcre	91
torquato	66	becassine, aues tres di-		chouchette petite	24	foulque	91
tortore	66	uerfe	112	chouette	15.23.24	fouton	112.0.
tortole, tortora	114.115	becaffon	112	chucas	124	francolino	60.63
rotano	89	belleque	91	cigogne	121	freneau	12
trapazorola	8	bequaiffe	110	cygne	81	freux	22.0.
tristarello	8	beque	95	cyne	81	frezaye	16
tristinculo	120	berée	48	cinit	44		G.
trumbono	45	bergerette	124	coc de bois	58	Gadrille	48
tfchirnabo	66	bergeronette iaulne		cocheuis	70	gay	26
tudon	30		124	cocou	34	gaion	26
turdela	66	bernachia	135	cocq	52	gal	52
turtura		berighot	49	cog	52	galerand	120
	V.	beurichon	49	colapa	124	garfote	77
Vcello del paradiso	100	bieure	86	colombe	57	gau	52
ucello di fanta Maria	100	bihoreau	117.0.	conta fazona	49	gauian	95
uerdon	45	bifer	66	coquu	34	geline	53
uerderro	45	biftarde	67	corbeau	21	gelinee sauvage	63
uerdmontan	45	boeuf de dieu	49	corbin petit	23	gellinote de bois	63
uertilla	38	brifeos	12	corlieu	113	geau	52
uerzerot	41	bruyan	41	corlieu petit	113.0.	glaumet	59
uipfiftrello	17	bosc	9	corlis	113	gorge rouge	48
uitriolo	100	boudrée	5	corneile	23	goutreuse	94
ulula	15	boufant	9	corneile de mer	22	graye	22.0.23.0.
upega	31	boufat	9	corneile emantelee	22	grailat	23.& 22.0.
urblan	65	boufat gentil, cōmun,		corneile fauuaage	22	grebe	95
		blanc ou chaulfe, ma-		cotee	78	griaibe	95
Z.		rin	9	coulon	57	grimauld	15
Zaranto	45						grim-



# Index.

grimpereau petit &	maulue	95	pie de muraille	38	rousserole	100.0.
grand	37 mauvis	28	pie rouge	36	roussignol	48
gruie	30 merle	32	pie uerd, uel iaulne		rougebourfe	48
gruie petite	30.0. merle au collier	33	36		roussignol de mur	48
gruie fiffalle	30 merle de rochiers	33	pie uerd le plus grand		rubeline	48
gruette	28 milan	8	35		S.	
grolle	12.0. 23.0. mesange	45	picaueret	43	Sarcelle	77
gros bec	40 mesange bleue	45	pie	28	scenicle	44
groulard	49.50 mesange hupée	46	pie ancrouelle	13	femetre	50
grue	19 mesange a la loge que-		pie escrayere	14	sefin	45
guespier	98 ue	47	pie griaychè ou grie-		ferrant	45
guinlon	44 moineau	41	sche	13	fifleur	49
H.	moineau de bois	44	pie de mer	137.0.	firicach	8
Halebran	77 moisson	41	pieumart	35	fifere	30
harle	85 môtan, uel môtain	44	pigeon fuyard	57	fiuette	15
haufsequeue	124 morillon	76	pigeon priue		foucie	49
herle	85 moucet	41	pigeon paté	57	fouette	15
heron gris ou cendre	mouette cendree	95	pimar	35	foulcie	49
117	mounier	100	pinfon	44	fourcicle	49
heron blanc	118 mourardier	51	pinfon d'Ardenne	44	fours chauue	17
heyron	117 moucherelle	42	pinfon royal	40	T.	
hibou	14 et 15.0. muschet	7	pion	49	Tarier	50
hibou cornu	14.0. N.		pitfchat	38	tarin	44
hirondelle grande	Nonnette	45	piuert	36.100	tartarin	100
51	O.		pioine	49	terco	38
hirondelle petite	51 Ofraie	129	plongeon grand de ri-		tercou	38
hirondelle de riuage	52 oye	73	uiere	88	ternier	38
houtarde	67 oye fauluage	72	plongeon petit	89	ters	85.0.
huart	6 oiseau de nerte	29	pöche	93	tierzelet	7
huette	15.0. orfraie	129	poul	49	tirin	44
hulote	15.0. orio	37	pouille	53	torchepot	37
hupe	31 oftarde	67	pouille d'eau	91	torcot	38
huppe	ibid. ouftarde	67	pouille de la Guinee	61	torcou	38
I.	P.		pouille d'Inde	56	tortorelle	66
Iaquette	28 Paiffe	41	puput uel putput	31	tourd	29
iars	73 paiffe de bois	44	Q.		touret	28
iodelle	91 paon	55	Quercerelle	8	tourte	66
ioudarde	91 papechieu	99	quinfon	44	touiterelle	66
L.	papegay	39	R.		traquet	50
Lainero	9 papegaut	39	Ralle	71	trasle	28
lauandiere	124 palfe	41	rasle	68.71	truble	92
lanier	9 passerat	41	rasle noir, & rouge ou		turcot	38
lanoy	9 passerau	41	degenet	71	turtrelle	66
lynette	43 perdris blanche de Sa-		rattepenade	17	V.	
linotte	43 uoie	65	rebetre	49	Vanneau	99
linotte rouge	43 perdris franche uel rou		redoyell	ibid.	uatoir	13
loere	88 ge	64	rezeto	ibid.	uerdeyre	45
loriot	37 perdris gaye uel gaille,		roy	49	uerdere	41
litorne	29 uel gaule	64	petit roy	ibid.	uerdereule	ibid.
lucherant	14 perdris goache (al. gou		le roy & mere des cail-		uerdier	45
lupege	31 ache) uel goiche	64	les	71	uerdier de haye	45
M.	perdris, gringette, grie		roytelet	49. bis	uerdrier	41
Machette	15 sche, de champs, gri-		roytolat	49	uerdun	ibidem
maienze	45 se, goache.	64	rolsignol	48	uidecucq	110
manfart	66 perdris de montaigne		rolsignol de muraille		uitcoc	110
marenge	45 63	48			Z.	
marcelet	51 perdris aux pieds rou-		rolsignol de ruiere		Zoetta	15
martinet	51 ges	64	100.0.		zoucet	89
martinet grand	51 pernisse	ibidem	rottolet	49		
martinet petit	52 perroquet	39	roucherole	100.0.	GERMANICA: quibus	
martinet pefcheur	100 pefcheur	100	roupeau	117.0.	etia Anglica pauca infè	
matagaffe	13 pie	35	roupie	48	runtur, A litera notata;	

# Index.

21	birgamsel	323	graw Entle	77	gyutte	99	
21	blaffertrapp	67	blaffer	75	grosse Entle	74	
adebar	121	blawmeiß	45	ent mit vier füßen	80	goldamer	41
adler	3	blawuogel	132. & 34. 0	kleine Entle	77	goldfinck	49
adler gschlecht zweyer		bleß	91	weltfche Entle	85	goldgyr	12
ley / in Wittenächti-		bleßing	91	wilde blawe Entle	75	goldhendlin	49
schen landen	4. 5	blütfinc	49	wilde grawe Entle	76	goldmerle	37
ein adler an einem füß		böllhine	91	ent Indianisch	133.	goll	49
blaw / am anderen		bömerle	28			gollammer	41
lichtgraw	4	bollebieck	40	Deerent auß Entle		glutt	105
ägerst	28	bollenbyffer	49	land	80	grasfinck	47
ägerst vß India	130	brömmesser	ibid.	ententstößel	6	grasfchnepf	112
ägerstenspecht	36	brachuogel	102. 113	erdbüül	120	grasfpecht	36
älte	24	brandmeiß	45	eselscheyer	94	griel	125
äschmeißle	64	branduogel	79	eul	15	grill	45
aglaster	28	branta 21.	135			grüß	113
alenbock	95	breitschnabel	80	fädemle	45	grünfinck	45
alpefachel	23	brendin 21.	135	falck	10	grünling	45
alprapp	23	brobuzen	91	fasan / fasian / fasant /		grünfpecht	36
amsel	32	bromhan	59	62		grügelhan	60
birgamsel	33. 0	büder berolff	37	fauser	120	gucker	34
bagamsel	33. 0	bunterfpecht	36	fel	96	guckerlin	50
steinamsel graw	132	büßfner	47	feelschwaln	97	guggauch	34
blaw / o.	ibidem	büßfinc	44	finck	44	güggel	52
ant	73	büßant	9	rotfinck	44	gügger	49
antuogel	73	büßarbn	ibid.	fischadler	129	gul	52
arßfüß	88	büße / büßhart	ibid.	fischarn	129	gumpel	49
arßfüß der Klein	89			fischent	80	gintell	50
afßgeyr	13	Chlän	37	fischer	6	gürfinck	49
afßtrac	22	atrinle	44	fischerlin	96		
angel	28	clatis Scotice	135	fischuogel	80	Habich	7
awerhan	58	clausfrapp	22	fyfterlin	106	häger	26
		curlew Angl.	113	flachfßfinck	43	häger ein andere art	
Bachamsel	123	craye Angl.	22. 0	fläddermuß	17	hähle	7
de duabus diuersis				florn	91	här	26
autibus		Seffyt	104	fluder	88	härßnäff	112
baumfalck	11	distelfinc	43	flügenfächerle	50	häger	26
baumganß	134	disteluogel	43	franc	14	hagant	75
& 135. 0.		dole	24			hail	49
baumbägel	26	dompschorn	120	Gacke	24	halbschnepflin	112. 0.
baumbecker	37	doterelle 21.	132	galgenregel	21	halckregel	21
baumfletterlin	37	düchchel	88	gäluogel	44	han	52
beemerle	27	düchtele zweyerley	89	ganß / ganner	86	ein frembder wilder	
beernerziemar	28	schwarz dücchele	89	ganß	73	Han auß Africa oß	
beena	23	duchentlin	89	wilde Ganß	72	Barbarien	61
behemle	27. 28	dumeling	49	gaulammer	41	ein Han mit wullen	
belch	91			geelgoß	41	54	
berckmeißle	47	Ebeher	121	geir	13	hanfens	113
belchine	91	eggenfchär	68	geyradler	5	hapch	7
bergander 21.	135	eisente	86. 87	geyrfchwalb	51	harschnepf	112
bergbüü	65	elbs	81	gerolff	37	baselbün	63
bergfchwalb	52	eifuogel	100. 132	gerfchwaln	51	basengcir	13
grosser bergfasan	58	elster	28	gybytz	99	bägel	26
kleiner bergfasan	59	elsterfpecht	36	gickerlin	50	baufhan	52
bergbüw	14	embutz	41	grienuögelin	50	beggesfchär	68
bergtroßel	28	emmeritz	41	gyfutz	99	beidenmeiß	46
bergtrul	23	emmering	41	gilberfchen	41	heidlerch	70
bernicla 21.	135	emmerling	41	gilbling	41	beyron	95
bymeisse	45	wyße Emberitz	42	welfcher Gilbling	127	heinn	53
bierolff	37	ent	73	gympel	49	benffling	43
birckilgen	77	ent	73	girau Brabantis	26	berzenuogel	26
byrolt	ibidem	graw Entle	135	girlitz	45	beerganß	117

# Index.

hertzog	14	Klosterfreuwe	124	meerach	85	parniffe	64
herrschnepf	112	Kobelmeiß	46	kleiner meerach	86	passer solitari	132
heubellerch	70	Kolfsalck	18	merzert	74	pernisse	64
heubelmeiß	46	Kolmeiß	45.46	meerrind	120	perter	43
hüellerch	70	Koppriegele	109	meustönig	49	psaff	91
hirngrill	45	Kornvogel	41	mew	95	psafflin	49
hirsuogel	45	Kortler	37	schwarzer (Neuw)	97	psannestiglig	47
bolbror	95	Kräe	23	mies	95	psannenstil	47
holbrüder	95	buskräe	23	mirgigeln	89	psaw	55
holkräe	35	schwarzkräe	23	mürle	11	psaffertrass	150
holzkräe	35	Krahe	23	müstelfinck	30	psesseruogel	139
wilde Holzkräe	21	Kräspecht	35	müster	30	psurzi	89
holzgerch	70	Krameruogel	29	mittelent	76	pickart	120
holzschreier	26	Kran/Kranich	19	mor	120	pilart	49
holzschnepf	111	Krichentlein	77	mosent	74	pilente	123
holzrub	66	Krye	19	moshuw	9	pilwegichen/ pilwen-	
groß Holzrub	66	Krisduue	66	moskü	120	cken	123
hünerabz	8	Krigente	77	moscho	120	pimpelmeiß	45
hünerdieb	8	Krimig	38	mosfreigel	120	pirckhün	58
hubu	15	Kropfelb	94	moswy	6.9	pittouer	120
hün	53	Kropfgans	94	mürmeiß	46	pumell	42
rot Hün	64	Kruckenle	77	muggent	74.78	pluchrub	66
wys wild Hün	65	Krümschnabel	40	münchlein	47	puffin A.	80
huru	14	Krüzuogel	40	münsterpyr	52	punterkräe	22
hürchelin	89	Kuckuck	34	mürent	74	punterpocht	36
horzybel	120	Kühenn	61	mürentle	77	purpuruogel	126
houare	121	Kuteramsel	33	mürhan	61. bis		
		Kutuogel	45	mürschwalb		52 Quackel/quetsch	71
Jäck	26	Kurz	15	mürspyr		52 quecker	49
imbenstrass	98			mürspecht		38 quickstern	124
imbenwolff	98	Lanete	9				
indianisch Hün	56	langschnabel	86	Nachegall	48	Rab	21
indianischer entrach	73	laubhan	59	nachtrabe	18	räbhün	64
		lesler/lepler	92	nachtram	18	rot Räbhün	64
ysengart	100	leiner	78	näbelkräe	22	welsch Räbhün	64
ysente	87	lerch	70	naterhals	38	wys Räbhün	65
ysentle	86	lynsinck	43	naterwendel	38	rägenuogel	103. 113
ysuogel	100	lystlicker	122	naterzwang	38	rayer	117
		lyster Hollandis	32	neppe	110	ranfalle	16
Käferentle	89	lochtub	66	nezscharb	84	rapp	21
Kaycke	24	löffler löffelgans	92	nesseltünig	49	rappuogel	45
Kalekuttisch hün	56	loirind	120	nünmörder	13	rarg	117
Kapertälze in Schot-	81	länningk	41	nunn	87	reckolternuogel	29
land	81	lustuogel	20	nusbücker	25.37	reidomel	120
Kappun/Kapaun/Kap				nusbrecher	25	reigel/reiger	117
han	54	Marcol	91	nusbrerscher	25	ein Reigelart	117
Kathan	31	marcolphus	26	nusbhäcker	37	reigel graw od blauw	
Kaatmeißle	46	margraff	26	nusbhäher	25		
Kernbeiß	40	matrkern	108			wysser Reigel	118
Kernell	86. & 77. 0.	matknullis	107	Odeboer	121	reiter	117
Kersentyse	37	meb	95	ochseneugle	49	reitmeiß	46
Kirchschwalb	52	meyspecht	37	ölb	81	retschent	75
Kirchhül	16	meysogelin	97	olimerle	37	riemling	137
Kirschneller	40	grosse Meiß	45	onuogel	45	thyment	87
Kirshinck	40	meelmeiß	45	osban	58	richau	26
Kyünig	99	meeradler	129	osprey A.	129	riegerle	109
Kläber	37	meercoot	91			riegher	117
Klätterspecht	38	merg	86	Pagelün 55. Saxon.		rietmeiß	46
Klatis 82 in Schott-		meercant	75	pappengey	39	rietchnepf	110.
land		meergans	94	teutscher Pappagey		rinderstar	34
Klepper	40	meerhüner	114. 115			ringamsel	32
Klinger	79	merl	32	paradyssuogel	20	ringelrub	66




# Index.

rinnenkläber	37	schwalbe	31	stirn	96	waldrötele	48
rynschwalmc	97	schwalm	51	stockhenffling	43	waldschneppf	111
rynüögele.	97	buschswalm	51	storck/storch	121	waldzinsfle	46
rynüogel	108	schwan	81	schwarzer storck	122	wallop	113
rötele	48	schwanzmeißle	47	storcent	74	wandwäher	8
busfrötele	48	schwarzkopff	47	storzent	74	wannenwäher	8
summerrötele	48	schweimer/schwemer/		struß	69	wantweber	8
rogis	86.0.			strußmeißlin	46	wasseramsel	123
roller 27 (rozdumpf)	120	seefluder	85	strüßle	49	wasserbünle	100
rozdumel/rozdump/		sehamßel	123	strußreigel	117	wasserbün	91
rozheüle	91. bis	seydenschwanz	27	Tabe T	24	welch Wasserbün	90
großer Rozreigel	119	seeschwalm	97	taube	57	wasserochs	120
rozreigel	120	seeuogel	75	zame Taube	57	wasserschwalme	97
roztrum	120	sickußt	39	thänfinck	44	wasserfetz wyß oder	
rozßamsel	33	sichler	116	thänmeißle	46	graw 124 gälbbide.	
rozßam	120	sißgen	44	thor	132	weggefertz	124
rozbein	101	sittich	39	thontrezer	13	wegflecklin	51
rozbüßle	48	rotgelber Sittich	38	thontreker	13	weye	8
rotfect	136	sinrlin	11	thumberz	49	weiher	8
rotbals	76	sneppe	110	thumpßaff	49	wetteruogel	113
rotelchyn	48	socke	77	thurntömeck	49	whaupe A.	113
rotckillis	107	solendgangs	83	tyrolt	37	wy	8
rotcköpflin	48	forentle	77	todrenuögele	50	wickel	7
rotschwenzel	48	spär	41	tortler	37	wydenzückerle	50
rotstertz	48	busßpar	41	trachals	38	wyderle	50
rotuogel	49. 136	spatz	41	trapp	67	wydhopf	31
rozßägel	48	grün Specht		trappgangs	67	widwal	37
rowert	44	großer schwarzer		triel	125	wiegwehen	8
rubin	43	Specht	35	trößel	77	windbals	38
rüche	89. & 12.0.	weyßspecht	36	troßel	30.0.	wynckernell	108
rüßgen	80	spechte	36	rot Troßel	28	winsel	28
rüßgele	89	blauw Spechte	37	tschürscherle	43	winterfinck	44
rüttelwy	9	speckmauß	17	schwarz Tücherlin	49	winterküninc	49
		perber	7	123	winterrötele	48	
Sackgangs	49	perck	41	tüchterle	89	wyntroßel	28
sägyser	116	perwer	7	tub	57	wintze	28
samerbünle 101. et 112.0		perlinck	41	gehöflele Tub	57	wynüögele	48
sanglerch	70	piegelenck	75	welsche Tub	57	winduogel	113
scharb	84	piegelmeiß	45	wilde Tuben art	67	wipstertz	27
schellent	79	spilhan	60	kleine wilde Tub	66	wisemertz	42
schilttrac	22	spyr	51. 97	wyße Tuchent	87	wisclgen	86
schlagtub	66	weyßer spyr	52	tul	24	wittewal	37
zame Schlagtub	57	spyrschwab	51	wilde Tul	23	wodcoc A.	110.
schleyereül	16	spyrer	96	turtel/turreltub	66	wüßling	47
schluchrente	86	spizschwanz	75	tutter	45	wüwe	8
schmirring	103	spreche	34				
schnäpflin	47	spring/springel	7				
schneefinck	44	staar	34				
schneegangs	72.94	steinamsel	33				
schneebün	65	steinbicker	122				
schnepp/schneppbün	110	steinbeyßer	40.122				
großer Schnepp	110	steinberg	23				
schnepplin	112	steingall	8				
schnerter	30	steingällyl	106				
schneuoogel	65	steinbün	64.65				
schnytkünig	49	steintautz	17				
schnurring	96	steinrapp	22				
schöfferle	43	steinrötele	34				
schößlin	43	steinsebmaz	8				
schottengangs	83	steintaben	26				
schrahtün	65	steintößfel	34				
schrye	113	steintulen	26				
schwäderle	45	stigelitz	43				













Leafy 4-Boo

Kall. #4 (alpha) 18 (alpha)

$a^6 b^4 c^4$   $a^6 - c^6$   $a^6 - z^6$   $A^6 - Z^6$   
 $Aa^6 - T^6$   $A^6 - H^6$

Kall. #4 77 1/2 4/10

RARE  
OVERSIZE 84-B  
QL 13226  
41  
939  
1551  
V.2-3

9.



